

Тема III. Линейные операторы

§ 6. Сингулярное разложение

М.В.Волков

Уральский федеральный университет
Институт естественных наук и математики
кафедра алгебры и фундаментальной информатики

2020/2021 учебный год

На прошлой лекции мы обсуждали полезное разложение линейных операторов на пространстве со скалярным произведением ([полярное разложение](#)). На матричном языке оно отвечает определенному разложению квадратных матриц.

На прошлой лекции мы обсуждали полезное разложение линейных операторов на пространстве со скалярным произведением ([полярное разложение](#)). На матричном языке оно отвечает определенному разложению квадратных матриц.

Сейчас рассмотрим ситуацию, когда имеются два пространства со скалярным произведением, U и V , и линейный оператор $\mathcal{A}: U \rightarrow V$.

На прошлой лекции мы обсуждали полезное разложение линейных операторов на пространстве со скалярным произведением ([полярное разложение](#)). На матричном языке оно отвечает определенному разложению квадратных матриц.

Сейчас рассмотрим ситуацию, когда имеются два пространства со скалярным произведением, U и V , и линейный оператор $\mathcal{A}: U \rightarrow V$.

Мы укажем некоторое разложение для матриц таких линейных операторов ([сингулярное разложение](#)). Заметим, что размеры матриц в этом случае произвольны.

На прошлой лекции мы обсуждали полезное разложение линейных операторов на пространстве со скалярным произведением ([полярное разложение](#)). На матричном языке оно отвечает определенному разложению квадратных матриц.

Сейчас рассмотрим ситуацию, когда имеются два пространства со скалярным произведением, U и V , и линейный оператор $\mathcal{A}: U \rightarrow V$.

Мы укажем некоторое разложение для матриц таких линейных операторов ([сингулярное разложение](#)). Заметим, что размеры матриц в этом случае произвольны.

Нам потребуются некоторые результаты осенного семестра, которые мы сейчас повторим.

Теорема (Эрик Ивар Фредгольм, 1903)

Если $\mathcal{A}: U \rightarrow V$ – линейный оператор пространств со скалярным произведением над полем $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, то $(\text{Im } \mathcal{A})^\perp = \text{Ker } \mathcal{A}^$.*

Теорема (Эрик Ивар Фредгольм, 1903)

Если $\mathcal{A}: U \rightarrow V$ – линейный оператор пространств со скалярным произведением над полем $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, то $(\text{Im } \mathcal{A})^\perp = \text{Ker } \mathcal{A}^$.*

Доказательство. Пусть $y \in \text{Ker } \mathcal{A}^*$, т.е. $\mathcal{A}^*y = 0$.

Теорема (Эрик Ивар Фредгольм, 1903)

Если $\mathcal{A}: U \rightarrow V$ – линейный оператор пространств со скалярным произведением над полем $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, то $(\text{Im } \mathcal{A})^\perp = \text{Ker } \mathcal{A}^$.*

Доказательство. Пусть $y \in \text{Ker } \mathcal{A}^*$, т.е. $\mathcal{A}^*y = 0$. Чтобы доказать, что $y \in (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$, возьмем любой вектор $x \in \text{Im } \mathcal{A}$ и проверим, что $y \perp x$.

Теорема (Эрик Ивар Фредгольм, 1903)

Если $\mathcal{A}: U \rightarrow V$ – линейный оператор пространств со скалярным произведением над полем $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, то $(\text{Im } \mathcal{A})^\perp = \text{Ker } \mathcal{A}^$.*

Доказательство. Пусть $y \in \text{Ker } \mathcal{A}^*$, т.е. $\mathcal{A}^*y = 0$. Чтобы доказать, что $y \in (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$, возьмем любой вектор $x \in \text{Im } \mathcal{A}$ и проверим, что $y \perp x$. Поскольку $x = \mathcal{A}u$ для некоторого вектора $u \in U$, имеем

$$xy = \mathcal{A}uy = u\mathcal{A}^*y = 0.$$

Теорема (Эрик Ивар Фредгольм, 1903)

Если $\mathcal{A}: U \rightarrow V$ – линейный оператор пространств со скалярным произведением над полем $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, то $(\text{Im } \mathcal{A})^\perp = \text{Ker } \mathcal{A}^$.*

Доказательство. Пусть $y \in \text{Ker } \mathcal{A}^*$, т.е. $\mathcal{A}^*y = 0$. Чтобы доказать, что $y \in (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$, возьмем любой вектор $x \in \text{Im } \mathcal{A}$ и проверим, что $y \perp x$. Поскольку $x = \mathcal{A}u$ для некоторого вектора $u \in U$, имеем

$$xy = \mathcal{A}uy = u\mathcal{A}^*y = 0.$$

Обратно, пусть $y \in (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$; тогда $xy = 0$ для любого вектора $x \in \text{Im } \mathcal{A}$.

Теорема (Эрик Ивар Фредгольм, 1903)

Если $\mathcal{A}: U \rightarrow V$ – линейный оператор пространств со скалярным произведением над полем $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, то $(\text{Im } \mathcal{A})^\perp = \text{Ker } \mathcal{A}^$.*

Доказательство. Пусть $y \in \text{Ker } \mathcal{A}^*$, т.е. $\mathcal{A}^*y = 0$. Чтобы доказать, что $y \in (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$, возьмем любой вектор $x \in \text{Im } \mathcal{A}$ и проверим, что $y \perp x$. Поскольку $x = \mathcal{A}u$ для некоторого вектора $u \in U$, имеем

$$xy = \mathcal{A}uy = u\mathcal{A}^*y = 0.$$

Обратно, пусть $y \in (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$; тогда $xy = 0$ для любого вектора $x \in \text{Im } \mathcal{A}$. Поэтому для произвольного вектора $u \in U$ имеем

$$0 = \mathcal{A}uy = u\mathcal{A}^*y.$$

Теорема (Эрик Ивар Фредгольм, 1903)

Если $\mathcal{A}: U \rightarrow V$ – линейный оператор пространств со скалярным произведением над полем $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, то $(\text{Im } \mathcal{A})^\perp = \text{Ker } \mathcal{A}^$.*

Доказательство. Пусть $y \in \text{Ker } \mathcal{A}^*$, т.е. $\mathcal{A}^*y = 0$. Чтобы доказать, что $y \in (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$, возьмем любой вектор $x \in \text{Im } \mathcal{A}$ и проверим, что $y \perp x$. Поскольку $x = \mathcal{A}u$ для некоторого вектора $u \in U$, имеем

$$xy = \mathcal{A}uy = u\mathcal{A}^*y = 0.$$

Обратно, пусть $y \in (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$; тогда $xy = 0$ для любого вектора $x \in \text{Im } \mathcal{A}$. Поэтому для произвольного вектора $u \in U$ имеем

$$0 = \mathcal{A}uy = u\mathcal{A}^*y.$$

Вектор \mathcal{A}^*y ортогонален произвольному вектору $u \in U$, и потому он нулевой. Отсюда $y \in \text{Ker } \mathcal{A}^*$. □

Теорема Фредгольма дает ортогональное разложение пространства V :

$$V = \text{Ker } \mathcal{A}^* \oplus \text{Im } \mathcal{A}.$$

Теорема Фредгольма дает ортогональное разложение пространства V :

$$V = \text{Ker } \mathcal{A}^* \oplus \text{Im } \mathcal{A}.$$

Применяя ту же теорему к сопряженному оператору $\mathcal{A}^*: V \rightarrow U$, получим ортогональное разложение пространства U :

$$U = \text{Ker } \mathcal{A} \oplus \text{Im } \mathcal{A}^*.$$

Теорема Фредгольма дает ортогональное разложение пространства V :

$$V = \text{Ker } \mathcal{A}^* \oplus \text{Im } \mathcal{A}.$$

Применяя ту же теорему к сопряженному оператору $\mathcal{A}^*: V \rightarrow U$, получим ортогональное разложение пространства U :

$$U = \text{Ker } \mathcal{A} \oplus \text{Im } \mathcal{A}^*.$$

Положим $U_0 := \text{Im } \mathcal{A}^*$, $V_0 := \text{Im } \mathcal{A}$ и обозначим через \mathcal{A}_0 *ограничение* оператора \mathcal{A} на подпространство U_0 .

Теорема Фредгольма дает ортогональное разложение пространства V :

$$V = \text{Ker } \mathcal{A}^* \oplus \text{Im } \mathcal{A}.$$

Применяя ту же теорему к сопряженному оператору $\mathcal{A}^*: V \rightarrow U$, получим ортогональное разложение пространства U :

$$U = \text{Ker } \mathcal{A} \oplus \text{Im } \mathcal{A}^*.$$

Положим $U_0 := \text{Im } \mathcal{A}^*$, $V_0 := \text{Im } \mathcal{A}$ и обозначим через \mathcal{A}_0 *ограничение* оператора \mathcal{A} на подпространство U_0 . Это означает, что вектор $\mathcal{A}_0 \mathbf{x}$ определен, только если $\mathbf{x} \in U_0$, и в этом случае $\mathcal{A}_0 \mathbf{x} := \mathcal{A} \mathbf{x}$.

Теорема Фредгольма дает ортогональное разложение пространства V :

$$V = \text{Ker } \mathcal{A}^* \oplus \text{Im } \mathcal{A}.$$

Применяя ту же теорему к сопряженному оператору $\mathcal{A}^*: V \rightarrow U$, получим ортогональное разложение пространства U :


$$U = \text{Ker } \mathcal{A} \oplus \text{Im } \mathcal{A}^*.$$

Положим $U_0 := \text{Im } \mathcal{A}^*$, $V_0 := \text{Im } \mathcal{A}$ и обозначим через \mathcal{A}_0 *ограничение* оператора \mathcal{A} на подпространство U_0 . Это означает, что вектор $\mathcal{A}_0 \mathbf{x}$ определен, только если $\mathbf{x} \in U_0$, и в этом случае $\mathcal{A}_0 \mathbf{x} := \mathcal{A} \mathbf{x}$.

Предложение

\mathcal{A}_0 — изоморфизм пространства U_0 на пространство V_0 .

Конфигурация из предложения



Доказательство. Проверим, что оператор \mathcal{A}_0 взаимно однозначен. Пусть $\mathcal{A}_0 \mathbf{x}_1 = \mathcal{A}_0 \mathbf{x}_2$ для $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in U_0$.

Доказательство. Проверим, что оператор \mathcal{A}_0 взаимно однозначен. Пусть $\mathcal{A}_0 \mathbf{x}_1 = \mathcal{A}_0 \mathbf{x}_2$ для $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in U_0$. Тогда $\mathcal{A}_0(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$, откуда $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \in \text{Ker } \mathcal{A}$.

Доказательство. Проверим, что оператор \mathcal{A}_0 взаимно однозначен. Пусть $\mathcal{A}_0\mathbf{x}_1 = \mathcal{A}_0\mathbf{x}_2$ для $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in U_0$. Тогда $\mathcal{A}_0(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$, откуда $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \in \text{Ker } \mathcal{A}$. Но $\text{Ker } \mathcal{A} \cap U_0 = \{\mathbf{0}\}$, поэтому $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$, т.е. $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$.

Доказательство. Проверим, что оператор \mathcal{A}_0 взаимно однозначен. Пусть $\mathcal{A}_0\mathbf{x}_1 = \mathcal{A}_0\mathbf{x}_2$ для $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in U_0$. Тогда $\mathcal{A}_0(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$, откуда $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \in \text{Ker } \mathcal{A}$. Но $\text{Ker } \mathcal{A} \cap U_0 = \{\mathbf{0}\}$, поэтому $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$, т.е. $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$.

Проверим, что \mathcal{A}_0 отображает U_0 на V_0 . Возьмем произвольный $\mathbf{y} \in V_0$. Поскольку $V_0 = \text{Im } \mathcal{A}$, найдется вектор $\mathbf{x} \in U$ такой, что $\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x}$.

Доказательство. Проверим, что оператор \mathcal{A}_0 взаимно однозначен. Пусть $\mathcal{A}_0\mathbf{x}_1 = \mathcal{A}_0\mathbf{x}_2$ для $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in U_0$. Тогда $\mathcal{A}_0(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$, откуда $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \in \text{Ker } \mathcal{A}$. Но $\text{Ker } \mathcal{A} \cap U_0 = \{\mathbf{0}\}$, поэтому $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$, т.е. $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$.

Проверим, что \mathcal{A}_0 отображает U_0 на V_0 . Возьмем произвольный $\mathbf{y} \in V_0$. Поскольку $V_0 = \text{Im } \mathcal{A}$, найдется вектор $\mathbf{x} \in U$ такой, что $\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x}$. Пользуясь ортогональным разложением $U = \text{Ker } \mathcal{A} \oplus U_0$, представим \mathbf{x} как $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{z}$, где $\mathbf{x}_0 \in U_0$, а $\mathbf{z} \in \text{Ker } \mathcal{A}$.

Доказательство. Проверим, что оператор \mathcal{A}_0 взаимно однозначен. Пусть $\mathcal{A}_0\mathbf{x}_1 = \mathcal{A}_0\mathbf{x}_2$ для $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in U_0$. Тогда $\mathcal{A}_0(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$, откуда $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \in \text{Ker } \mathcal{A}$. Но $\text{Ker } \mathcal{A} \cap U_0 = \{\mathbf{0}\}$, поэтому $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$, т.е. $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$.

Проверим, что \mathcal{A}_0 отображает U_0 на V_0 . Возьмем произвольный $\mathbf{y} \in V_0$. Поскольку $V_0 = \text{Im } \mathcal{A}$, найдется вектор $\mathbf{x} \in U$ такой, что $\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x}$. Пользуясь ортогональным разложением $U = \text{Ker } \mathcal{A} \oplus U_0$, представим \mathbf{x} как $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{z}$, где $\mathbf{x}_0 \in U_0$, а $\mathbf{z} \in \text{Ker } \mathcal{A}$. Тогда

$$\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x} = \mathcal{A}(\mathbf{x}_0 + \mathbf{z}) = \mathcal{A}\mathbf{x}_0 + \mathcal{A}\mathbf{z}$$

Доказательство. Проверим, что оператор \mathcal{A}_0 взаимно однозначен. Пусть $\mathcal{A}_0\mathbf{x}_1 = \mathcal{A}_0\mathbf{x}_2$ для $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in U_0$. Тогда $\mathcal{A}_0(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$, откуда $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \in \text{Ker } \mathcal{A}$. Но $\text{Ker } \mathcal{A} \cap U_0 = \{\mathbf{0}\}$, поэтому $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$, т.е. $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$.

Проверим, что \mathcal{A}_0 отображает U_0 на V_0 . Возьмем произвольный $\mathbf{y} \in V_0$. Поскольку $V_0 = \text{Im } \mathcal{A}$, найдется вектор $\mathbf{x} \in U$ такой, что $\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x}$. Пользуясь ортогональным разложением $U = \text{Ker } \mathcal{A} \oplus U_0$, представим \mathbf{x} как $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{z}$, где $\mathbf{x}_0 \in U_0$, а $\mathbf{z} \in \text{Ker } \mathcal{A}$. Тогда

$$\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x} = \mathcal{A}(\mathbf{x}_0 + \mathbf{z}) = \mathcal{A}\mathbf{x}_0 + \mathcal{A}\mathbf{z} = \mathcal{A}\mathbf{x}_0 = \mathcal{A}_0\mathbf{x}_0.$$

□

Доказательство. Проверим, что оператор \mathcal{A}_0 взаимно однозначен. Пусть $\mathcal{A}_0\mathbf{x}_1 = \mathcal{A}_0\mathbf{x}_2$ для $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in U_0$. Тогда $\mathcal{A}_0(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$, откуда $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \in \text{Ker } \mathcal{A}$. Но $\text{Ker } \mathcal{A} \cap U_0 = \{\mathbf{0}\}$, поэтому $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$, т.е. $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$.

Проверим, что \mathcal{A}_0 отображает U_0 на V_0 . Возьмем произвольный $\mathbf{y} \in V_0$. Поскольку $V_0 = \text{Im } \mathcal{A}$, найдется вектор $\mathbf{x} \in U$ такой, что $\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x}$. Пользуясь ортогональным разложением $U = \text{Ker } \mathcal{A} \oplus U_0$, представим \mathbf{x} как $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{z}$, где $\mathbf{x}_0 \in U_0$, а $\mathbf{z} \in \text{Ker } \mathcal{A}$. Тогда

$$\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x} = \mathcal{A}(\mathbf{x}_0 + \mathbf{z}) = \mathcal{A}\mathbf{x}_0 + \mathcal{A}\mathbf{z} = \mathcal{A}\mathbf{x}_0 = \mathcal{A}_0\mathbf{x}_0.$$

□

В силу предложения $\dim U_0 = \dim V_0$; эта размерность равна рангу оператора \mathcal{A} , который мы обозначим через r .

Доказательство. Проверим, что оператор \mathcal{A}_0 взаимно однозначен. Пусть $\mathcal{A}_0\mathbf{x}_1 = \mathcal{A}_0\mathbf{x}_2$ для $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in U_0$. Тогда $\mathcal{A}_0(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$, откуда $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 \in \text{Ker } \mathcal{A}$. Но $\text{Ker } \mathcal{A} \cap U_0 = \{\mathbf{0}\}$, поэтому $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2 = \mathbf{0}$, т.е. $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$.

Проверим, что \mathcal{A}_0 отображает U_0 на V_0 . Возьмем произвольный $\mathbf{y} \in V_0$. Поскольку $V_0 = \text{Im } \mathcal{A}$, найдется вектор $\mathbf{x} \in U$ такой, что $\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x}$. Пользуясь ортогональным разложением $U = \text{Ker } \mathcal{A} \oplus U_0$, представим \mathbf{x} как $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{z}$, где $\mathbf{x}_0 \in U_0$, а $\mathbf{z} \in \text{Ker } \mathcal{A}$. Тогда

$$\mathbf{y} = \mathcal{A}\mathbf{x} = \mathcal{A}(\mathbf{x}_0 + \mathbf{z}) = \mathcal{A}\mathbf{x}_0 + \mathcal{A}\mathbf{z} = \mathcal{A}\mathbf{x}_0 = \mathcal{A}_0\mathbf{x}_0.$$

□

В силу предложения $\dim U_0 = \dim V_0$; эта размерность равна рангу оператора \mathcal{A} , который мы обозначим через r . Построим «согласованные» ортонормированные базисы в U_0 и V_0 .

∇1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

▽1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

∇1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $\mathbf{x} \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

▼1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $\mathbf{x} \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Тогда

$$0 = \mathbf{x}((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x}) = \mathbf{x}(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{x}))$$

▼1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $\mathbf{x} \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Тогда

$$0 = \mathbf{x}((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x}) = \mathbf{x}(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{x})) = (\mathcal{A}\mathbf{x})(\mathcal{A}\mathbf{x}).$$

∇1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $x \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x = \mathbf{0}$. Тогда

$$0 = x((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x) = x(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}x)) = (\mathcal{A}x)(\mathcal{A}x).$$

Отсюда $\mathcal{A}x = \mathbf{0}$, т.е. $x \in \text{Ker } \mathcal{A}$.



∇1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $x \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x = 0$. Тогда

$$0 = x((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x) = x(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}x)) = (\mathcal{A}x)(\mathcal{A}x).$$

Отсюда $\mathcal{A}x = 0$, т.е. $x \in \text{Ker } \mathcal{A}$.

□

Из **∇1** следует, что ограничение оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ на подпространство U_0 невырождено.

∇1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $x \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x = 0$. Тогда

$$0 = x((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x) = x(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}x)) = (\mathcal{A}x)(\mathcal{A}x).$$

Отсюда $\mathcal{A}x = 0$, т.е. $x \in \text{Ker } \mathcal{A}$.

□

Из **∇1** следует, что ограничение оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ на подпространство U_0 невырождено. Тогда это ограничение – положительный оператор, так как $((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x)x$

▽1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $x \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x = 0$. Тогда

$$0 = x((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x) = x(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}x)) = (\mathcal{A}x)(\mathcal{A}x).$$

Отсюда $\mathcal{A}x = 0$, т.е. $x \in \text{Ker } \mathcal{A}$.

□

Из **▽1** следует, что ограничение оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ на подпространство U_0 невырождено. Тогда это ограничение – положительный оператор, так как $((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x)x = (\mathcal{A}^*(\mathcal{A}x))x$

∇1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $x \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x = 0$. Тогда

$$0 = x((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x) = x(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}x)) = (\mathcal{A}x)(\mathcal{A}x).$$

Отсюда $\mathcal{A}x = 0$, т.е. $x \in \text{Ker } \mathcal{A}$.

□

Из **∇1** следует, что ограничение оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ на подпространство U_0 невырождено. Тогда это ограничение – положительный оператор, так как $((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x)x = (\mathcal{A}^*(\mathcal{A}x))x = (\mathcal{A}x)(\mathcal{A}x) > 0$ для ненулевых векторов $x \in U_0$.

▽1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $x \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x = 0$. Тогда

$$0 = x((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x) = x(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}x)) = (\mathcal{A}x)(\mathcal{A}x).$$

Отсюда $\mathcal{A}x = 0$, т.е. $x \in \text{Ker } \mathcal{A}$. □

Из **▽1** следует, что ограничение оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ на подпространство U_0 невырождено. Тогда это ограничение – положительный оператор, так как $((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x)x = (\mathcal{A}^*(\mathcal{A}x))x = (\mathcal{A}x)(\mathcal{A}x) > 0$ для ненулевых векторов $x \in U_0$.

Выберем в U_0 ортонормированный базис u_1, \dots, u_r из собственных векторов оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$, принадлежащих собственным значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$.

∇1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $x \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x = 0$. Тогда

$$0 = x((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x) = x(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}x)) = (\mathcal{A}x)(\mathcal{A}x).$$

Отсюда $\mathcal{A}x = 0$, т.е. $x \in \text{Ker } \mathcal{A}$. □

Из **∇1** следует, что ограничение оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ на подпространство U_0 невырождено. Тогда это ограничение – положительный оператор, так как $((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x)x = (\mathcal{A}^*(\mathcal{A}x))x = (\mathcal{A}x)(\mathcal{A}x) > 0$ для ненулевых векторов $x \in U_0$.

Выберем в U_0 ортонормированный базис u_1, \dots, u_r из собственных векторов оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$, принадлежащих собственным значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$. Образы $\mathcal{A}u_1, \dots, \mathcal{A}u_r$ этих векторов лежат в V_0 и попарно ортогональны.

▽1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $x \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x = 0$. Тогда

$$0 = x((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x) = x(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}x)) = (\mathcal{A}x)(\mathcal{A}x).$$

Отсюда $\mathcal{A}x = 0$, т.е. $x \in \text{Ker } \mathcal{A}$. □

Из **▽1** следует, что ограничение оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ на подпространство U_0 невырождено. Тогда это ограничение – положительный оператор, так как $((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x)x = (\mathcal{A}^*(\mathcal{A}x))x = (\mathcal{A}x)(\mathcal{A}x) > 0$ для ненулевых векторов $x \in U_0$.

Выберем в U_0 ортонормированный базис u_1, \dots, u_r из собственных векторов оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$, принадлежащих собственным значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$. Образы $\mathcal{A}u_1, \dots, \mathcal{A}u_r$ этих векторов лежат в V_0 и попарно ортогональны. Действительно, при $i \neq j$

$$\mathcal{A}u_i \mathcal{A}u_j = u_i(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}u_j)) = u_i((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)u_j)$$

▽1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $\mathbf{x} \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Тогда

$$0 = \mathbf{x}((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x}) = \mathbf{x}(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{x})) = (\mathcal{A}\mathbf{x})(\mathcal{A}\mathbf{x}).$$

Отсюда $\mathcal{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, т.е. $\mathbf{x} \in \text{Ker } \mathcal{A}$. □

Из **▽1** следует, что ограничение оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ на подпространство U_0 невырождено. Тогда это ограничение – положительный оператор, так как $((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x})\mathbf{x} = (\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{x}))\mathbf{x} = (\mathcal{A}\mathbf{x})(\mathcal{A}\mathbf{x}) > 0$ для ненулевых векторов $\mathbf{x} \in U_0$.

Выберем в U_0 ортонормированный базис $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$ из собственных векторов оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$, принадлежащих собственным значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$. Образы $\mathcal{A}\mathbf{u}_1, \dots, \mathcal{A}\mathbf{u}_r$ этих векторов лежат в V_0 и попарно ортогональны. Действительно, при $i \neq j$

$$\mathcal{A}\mathbf{u}_i \mathcal{A}\mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{u}_j)) = \mathbf{u}_i((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{u}_j) = \mathbf{u}_i(\lambda_j \mathbf{u}_j) = \lambda_j \mathbf{u}_i \mathbf{u}_j = 0.$$

В1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $\mathbf{x} \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Тогда

$$0 = \mathbf{x}((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x}) = \mathbf{x}(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{x})) = (\mathcal{A}\mathbf{x})(\mathcal{A}\mathbf{x}).$$

Отсюда $\mathcal{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, т.е. $\mathbf{x} \in \text{Ker } \mathcal{A}$. □

Из **В1** следует, что ограничение оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ на подпространство U_0 невырождено. Тогда это ограничение – положительный оператор, так как $((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x})\mathbf{x} = (\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{x}))\mathbf{x} = (\mathcal{A}\mathbf{x})(\mathcal{A}\mathbf{x}) > 0$ для ненулевых векторов $\mathbf{x} \in U_0$.

Выберем в U_0 ортонормированный базис $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$ из собственных векторов оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$, принадлежащих собственным значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$. Образы $\mathcal{A}\mathbf{u}_1, \dots, \mathcal{A}\mathbf{u}_r$ этих векторов лежат в V_0 и попарно ортогональны. Действительно, при $i \neq j$

$$\mathcal{A}\mathbf{u}_i \mathcal{A}\mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{u}_j)) = \mathbf{u}_i((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{u}_j) = \mathbf{u}_i(\lambda_j \mathbf{u}_j) = \lambda_j \mathbf{u}_i \mathbf{u}_j = 0.$$

Положим $\mu_i := \sqrt{\lambda_i}$ и $\mathbf{v}_i := \mu_i^{-1} \mathcal{A}\mathbf{u}_i$ для каждого $i = 1, \dots, r$.

В1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $x \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x = 0$. Тогда

$$0 = x((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x) = x(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}x)) = (\mathcal{A}x)(\mathcal{A}x).$$

Отсюда $\mathcal{A}x = 0$, т.е. $x \in \text{Ker } \mathcal{A}$. □

Из **В1** следует, что ограничение оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ на подпространство U_0 невырождено. Тогда это ограничение – положительный оператор, так как $((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)x)x = (\mathcal{A}^*(\mathcal{A}x))x = (\mathcal{A}x)(\mathcal{A}x) > 0$ для ненулевых векторов $x \in U_0$.

Выберем в U_0 ортонормированный базис u_1, \dots, u_r из собственных векторов оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$, принадлежащих собственным значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$. Образы $\mathcal{A}u_1, \dots, \mathcal{A}u_r$ этих векторов лежат в V_0 и попарно ортогональны. Действительно, при $i \neq j$

$$\mathcal{A}u_i \mathcal{A}u_j = u_i(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}u_j)) = u_i((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)u_j) = u_i(\lambda_j u_j) = \lambda_j u_i u_j = 0.$$

Положим $\mu_i := \sqrt{\lambda_i}$ и $v_i := \mu_i^{-1} \mathcal{A}u_i$ для каждого $i = 1, \dots, r$. Тогда

$$|v_i|^2 = v_i v_i = \frac{(\mathcal{A}u_i)(\mathcal{A}u_i)}{\mu_i^2}$$

В1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $\mathbf{x} \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Тогда

$$0 = \mathbf{x}((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x}) = \mathbf{x}(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{x})) = (\mathcal{A}\mathbf{x})(\mathcal{A}\mathbf{x}).$$

Отсюда $\mathcal{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, т.е. $\mathbf{x} \in \text{Ker } \mathcal{A}$. □

Из **В1** следует, что ограничение оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ на подпространство U_0 невырождено. Тогда это ограничение – положительный оператор, так как $((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x})\mathbf{x} = (\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{x}))\mathbf{x} = (\mathcal{A}\mathbf{x})(\mathcal{A}\mathbf{x}) > 0$ для ненулевых векторов $\mathbf{x} \in U_0$.

Выберем в U_0 ортонормированный базис $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$ из собственных векторов оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$, принадлежащих собственным значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$. Образы $\mathcal{A}\mathbf{u}_1, \dots, \mathcal{A}\mathbf{u}_r$ этих векторов лежат в V_0 и попарно ортогональны. Действительно, при $i \neq j$

$$\mathcal{A}\mathbf{u}_i \mathcal{A}\mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{u}_j)) = \mathbf{u}_i((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{u}_j) = \mathbf{u}_i(\lambda_j \mathbf{u}_j) = \lambda_j \mathbf{u}_i \mathbf{u}_j = 0.$$

Положим $\mu_i := \sqrt{\lambda_i}$ и $\mathbf{v}_i := \mu_i^{-1} \mathcal{A}\mathbf{u}_i$ для каждого $i = 1, \dots, r$. Тогда

$$|\mathbf{v}_i|^2 = \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i = \frac{(\mathcal{A}\mathbf{u}_i)(\mathcal{A}\mathbf{u}_i)}{\mu_i^2} = \frac{\mathbf{u}_i(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{u}_i))}{\mu_i^2} = \frac{\mathbf{u}_i((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{u}_i)}{\mu_i^2}$$

V1. $\text{Ker } \mathcal{A} = \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$.

Доказательство. Ясно, что $\text{Ker } \mathcal{A} \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$. Обратно, пусть $\mathbf{x} \in \text{Ker } \mathcal{A}\mathcal{A}^*$, т.е. $(\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Тогда

$$0 = \mathbf{x}((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x}) = \mathbf{x}(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{x})) = (\mathcal{A}\mathbf{x})(\mathcal{A}\mathbf{x}).$$

Отсюда $\mathcal{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$, т.е. $\mathbf{x} \in \text{Ker } \mathcal{A}$. □

Из V1 следует, что ограничение оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ на подпространство U_0 невырождено. Тогда это ограничение – положительный оператор, так как $((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{x})\mathbf{x} = (\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{x}))\mathbf{x} = (\mathcal{A}\mathbf{x})(\mathcal{A}\mathbf{x}) > 0$ для ненулевых векторов $\mathbf{x} \in U_0$.

Выберем в U_0 ортонормированный базис $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$ из собственных векторов оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$, принадлежащих собственным значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_r > 0$. Образы $\mathcal{A}\mathbf{u}_1, \dots, \mathcal{A}\mathbf{u}_r$ этих векторов лежат в V_0 и попарно ортогональны. Действительно, при $i \neq j$

$$\mathcal{A}\mathbf{u}_i \mathcal{A}\mathbf{u}_j = \mathbf{u}_i(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{u}_j)) = \mathbf{u}_i((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{u}_j) = \mathbf{u}_i(\lambda_j \mathbf{u}_j) = \lambda_j \mathbf{u}_i \mathbf{u}_j = 0.$$

Положим $\mu_i := \sqrt{\lambda_i}$ и $\mathbf{v}_i := \mu_i^{-1} \mathcal{A}\mathbf{u}_i$ для каждого $i = 1, \dots, r$. Тогда

$$|\mathbf{v}_i|^2 = \mathbf{v}_i \mathbf{v}_i = \frac{(\mathcal{A}\mathbf{u}_i)(\mathcal{A}\mathbf{u}_i)}{\mu_i^2} = \frac{\mathbf{u}_i(\mathcal{A}^*(\mathcal{A}\mathbf{u}_i))}{\mu_i^2} = \frac{\mathbf{u}_i((\mathcal{A}\mathcal{A}^*)\mathbf{u}_i)}{\mu_i^2} = \frac{\lambda_i}{\mu_i^2} = 1.$$

Итак, вектора v_1, \dots, v_r образуют ортонормированный базис подпространства V_0 .

Сингулярные базисы (2)

Итак, вектора $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ образуют ортонормированный базис подпространства V_0 . Дополним систему $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ ортонормированным базисом пространства $\text{Ker } \mathcal{A}^* = (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$ до ортонормированного базиса $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ всего пространства V , здесь $n := \dim V$.

Сингулярные базисы (2)

Итак, вектора $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ образуют ортонормированный базис подпространства V_0 . Дополним систему $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ ортонормированным базисом пространства $\text{Ker } \mathcal{A}^* = (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$ до ортонормированного базиса $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ всего пространства V , здесь $n := \dim V$. Аналогично, систему $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$ дополним ортонормированным базисом пространства $\text{Ker } \mathcal{A} = (\text{Im } \mathcal{A}^*)^\perp$ до ортонормированного базиса $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_k$ всего пространства U , здесь $k := \dim U$.

Сингулярные базисы (2)

Итак, вектора $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ образуют ортонормированный базис подпространства V_0 . Дополним систему $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ ортонормированным базисом пространства $\text{Ker } \mathcal{A}^* = (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$ до ортонормированного базиса $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ всего пространства V , здесь $n := \dim V$. Аналогично, систему $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$ дополним ортонормированным базисом пространства $\text{Ker } \mathcal{A} = (\text{Im } \mathcal{A}^*)^\perp$ до ортонормированного базиса $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_k$ всего пространства U , здесь $k := \dim U$. Эти ортонормированные базисы называются *сингулярными базисами* оператора \mathcal{A} , а числа $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ – его *сингулярными числами*.

Сингулярные базисы (2)

Итак, вектора $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ образуют ортонормированный базис подпространства V_0 . Дополним систему $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ ортонормированным базисом пространства $\text{Ker } \mathcal{A}^* = (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$ до ортонормированного базиса $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ всего пространства V , здесь $n := \dim V$. Аналогично, систему $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$ дополним ортонормированным базисом пространства $\text{Ker } \mathcal{A} = (\text{Im } \mathcal{A}^*)^\perp$ до ортонормированного базиса $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_k$ всего пространства U , здесь $k := \dim U$. Эти ортонормированные базисы называются *сингулярными базисами* оператора \mathcal{A} , а числа $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ – его *сингулярными числами*. Обычно первые r векторов в сингулярных базисах нумеруют так, чтобы сингулярные числа шли в порядке убывания: $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_r > 0$.

Сингулярные базисы (2)

Итак, вектора $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ образуют ортонормированный базис подпространства V_0 . Дополним систему $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ ортонормированным базисом пространства $\text{Ker } \mathcal{A}^* = (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$ до ортонормированного базиса $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ всего пространства V , здесь $n := \dim V$.

Аналогично, систему $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$ дополним ортонормированным базисом пространства $\text{Ker } \mathcal{A} = (\text{Im } \mathcal{A}^*)^\perp$ до ортонормированного базиса $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_k$ всего пространства U , здесь $k := \dim U$.

Эти ортонормированные базисы называются *сингулярными базисами* оператора \mathcal{A} , а числа $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ – его *сингулярными числами*.

Обычно первые r векторов в сингулярных базисах нумеруют так, чтобы сингулярные числа шли в порядке убывания: $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_r > 0$.

Действие оператора \mathcal{A} в его сингулярных базисах прозрачно донельзя:

$$\mathcal{A}\mathbf{u}_i = \begin{cases} \mu_i \mathbf{v}_i, & \text{если } i \leq r, \\ 0, & \text{если } i > r. \end{cases}$$

Сингулярные базисы (2)

Итак, вектора $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ образуют ортонормированный базис подпространства V_0 . Дополним систему $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r$ ортонормированным базисом пространства $\text{Ker } \mathcal{A}^* = (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$ до ортонормированного базиса $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r, \mathbf{v}_{r+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ всего пространства V , здесь $n := \dim V$. Аналогично, систему $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r$ дополним ортонормированным базисом пространства $\text{Ker } \mathcal{A} = (\text{Im } \mathcal{A}^*)^\perp$ до ортонормированного базиса $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_k$ всего пространства U , здесь $k := \dim U$. Эти ортонормированные базисы называются *сингулярными базисами* оператора \mathcal{A} , а числа $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ – его *сингулярными числами*. Обычно первые r векторов в сингулярных базисах нумеруют так, чтобы сингулярные числа шли в порядке убывания: $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_r > 0$. Действие оператора \mathcal{A} в его сингулярных базисах прозрачно донельзя:

$$\mathcal{A}\mathbf{u}_i = \begin{cases} \mu_i \mathbf{v}_i, & \text{если } i \leq r, \\ 0, & \text{если } i > r. \end{cases}$$

Поэтому матрица оператора \mathcal{A} в его сингулярных базисах устроена так: в ней на местах $(1, 1), (2, 2), \dots, (r, r)$ стоят соответствующие сингулярные числа $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$, а на всех остальных местах – нули.

Мы доказали большую часть следующего результата:

Теорема (сингулярное представление линейного оператора)

Для любого линейного оператора $A: U \rightarrow V$ пространств со скалярным произведением в U и V можно выбрать ортонормированные базисы, в которых его матрица имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_r & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \quad (\#)$$

где r – ранг A , а $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ – положительные действительные числа, определяемые однозначно с точностью до порядка.

Мы доказали большую часть следующего результата:

Теорема (сингулярное представление линейного оператора)

Для любого линейного оператора $A: U \rightarrow V$ пространств со скалярным произведением в U и V можно выбрать ортонормированные базисы, в которых его матрица имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_r & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}, \quad (\#)$$

где r – ранг A , а $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ – положительные действительные числа, определяемые однозначно с точностью до порядка.

Доказательство. Осталось доказать только то, что если матрица оператора A в каких-то ортонормированных базисах имеет вид $(\#)$, то диагональные элементы этой матрицы определены однозначно с точностью до порядка.

Сингулярное разложение (2)

Действительно, если B_U и B_V – какие-то ортонормированные базисы в U и V , а A – матрица оператора \mathcal{A} в этих базисах, то матрица сопряженного оператора \mathcal{A}^* в тех же базисах есть A^* .

Действительно, если B_U и B_V – какие-то ортонормированные базисы в U и V , а A – матрица оператора \mathcal{A} в этих базисах, то матрица сопряженного оператора \mathcal{A}^* в тех же базисах есть A^* . Если A имеет вид $(\#)$, то $A^* = A^T$.

Действительно, если B_U и B_V – какие-то ортонормированные базисы в U и V , а A – матрица оператора \mathcal{A} в этих базисах, то матрица сопряженного оператора \mathcal{A}^* в тех же базисах есть A^* . Если A имеет вид $(\#)$, то $A^* = A^T$. Поэтому матрица оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ в базисе B_U – квадратная диагональная матрица с ненулевыми элементами диагонали, равными $\mu_1^2, \mu_2^2, \dots, \mu_r^2$.

Действительно, если B_U и B_V – какие-то ортонормированные базисы в U и V , а A – матрица оператора \mathcal{A} в этих базисах, то матрица сопряженного оператора \mathcal{A}^* в тех же базисах есть A^* . Если A имеет вид $(\#)$, то $A^* = A^T$. Поэтому матрица оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ в базисе B_U – квадратная диагональная матрица с ненулевыми элементами диагонали, равными $\mu_1^2, \mu_2^2, \dots, \mu_r^2$. Если матрица оператора в некотором базисе диагональна, то на диагонали стоят его собственные значения.

Сингулярное разложение (2)

Действительно, если B_U и B_V – какие-то ортонормированные базисы в U и V , а A – матрица оператора \mathcal{A} в этих базисах, то матрица сопряженного оператора \mathcal{A}^* в тех же базисах есть A^* . Если A имеет вид $(\#)$, то $A^* = A^T$. Поэтому матрица оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$ в базисе B_U – квадратная диагональная матрица с ненулевыми элементами диагонали, равными $\mu_1^2, \mu_2^2, \dots, \mu_r^2$. Если матрица оператора в некотором базисе диагональна, то на диагонали стоят его собственные значения. Значит, $\mu_1^2, \mu_2^2, \dots, \mu_r^2$ – собственные значения оператора $\mathcal{A}\mathcal{A}^*$, а следовательно, $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ суть в точности сингулярные числа оператора \mathcal{A} и не зависят от базисов B_U и B_V . \square

Следствие (SVD, Джеймс Джозеф Сильвестр, 1889)

Пусть F – одно из полей \mathbb{R} или \mathbb{C} , а M – произвольная $k \times n$ -матрица над F . Существует пара ортогональных (унитарных) матриц $R \in M_k(F)$ и $S \in M_n(F)$ такая, что $M = RAS$, где A – матрица вида $(\#)$, где r – ранг матрицы M , а $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ – положительные действительные числа, определяемые однозначно с точностью до порядка.

Следствие (SVD, Джеймс Джозеф Сильвестр, 1889)

Пусть F – одно из полей \mathbb{R} или \mathbb{C} , а M – произвольная $k \times n$ -матрица над F . Существует пара ортогональных (унитарных) матриц $R \in M_k(F)$ и $S \in M_n(F)$ такая, что $M = RAS$, где A – матрица вида $(\#)$, где r – ранг матрицы M , а $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ – положительные действительные числа, определяемые однозначно с точностью до порядка.

Доказательство. Определим оператор $\mathcal{A}: F^n \rightarrow F^k$ таким правилом:
 $\mathcal{A}\mathbf{x} := M\mathbf{x}$.

Следствие (SVD, Джеймс Джозеф Сильвестр, 1889)

Пусть F – одно из полей \mathbb{R} или \mathbb{C} , а M – произвольная $k \times n$ -матрица над F . Существует пара ортогональных (унитарных) матриц $R \in M_k(F)$ и $S \in M_n(F)$ такая, что $M = RAS$, где A – матрица вида $(\#)$, где r – ранг матрицы M , а $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ – положительные действительные числа, определяемые однозначно с точностью до порядка.

Доказательство. Определим оператор $\mathcal{A}: F^n \rightarrow F^k$ таким правилом: $\mathcal{A}\mathbf{x} := M\mathbf{x}$. По теореме в F^n и F^k есть ортонормированные базисы, скажем, B_n и B_k , в которых матрица A оператора \mathcal{A} имеет вид $(\#)$.

Следствие (SVD, Джеймс Джозеф Сильвестр, 1889)

Пусть F – одно из полей \mathbb{R} или \mathbb{C} , а M – произвольная $k \times n$ -матрица над F . Существует пара ортогональных (унитарных) матриц $R \in M_k(F)$ и $S \in M_n(F)$ такая, что $M = RAS$, где A – матрица вида $(\#)$, где r – ранг матрицы M , а $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ – положительные действительные числа, определяемые однозначно с точностью до порядка.

Доказательство. Определим оператор $\mathcal{A}: F^n \rightarrow F^k$ таким правилом: $\mathcal{A}\mathbf{x} := M\mathbf{x}$. По теореме в F^n и F^k есть ортонормированные базисы, скажем, B_n и B_k , в которых матрица A оператора \mathcal{A} имеет вид $(\#)$. С другой стороны, M есть матрица оператора \mathcal{A} в стандартных ортонормированных базисах пространств F^n и F^k .

Следствие (SVD, Джеймс Джозеф Сильвестр, 1889)

Пусть F – одно из полей \mathbb{R} или \mathbb{C} , а M – произвольная $k \times n$ -матрица над F . Существует пара ортогональных (унитарных) матриц $R \in M_k(F)$ и $S \in M_n(F)$ такая, что $M = RAS$, где A – матрица вида $(\#)$, где r – ранг матрицы M , а $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ – положительные действительные числа, определяемые однозначно с точностью до порядка.

Доказательство. Определим оператор $\mathcal{A}: F^n \rightarrow F^k$ таким правилом: $\mathcal{A}\mathbf{x} := M\mathbf{x}$. По теореме в F^n и F^k есть ортонормированные базисы, скажем, B_n и B_k , в которых матрица A оператора \mathcal{A} имеет вид $(\#)$. С другой стороны, M есть матрица оператора \mathcal{A} в стандартных ортонормированных базисах пространств F^n и F^k . Обозначим через R матрицу перехода от стандартного базиса пространства F^k к базису B_k , а через S матрицу перехода от базиса B_n к стандартному базису пространства F^n .

Следствие (SVD, Джеймс Джозеф Сильвестр, 1889)

Пусть F – одно из полей \mathbb{R} или \mathbb{C} , а M – произвольная $k \times n$ -матрица над F . Существует пара ортогональных (унитарных) матриц $R \in M_k(F)$ и $S \in M_n(F)$ такая, что $M = RAS$, где A – матрица вида $(\#)$, где r – ранг матрицы M , а $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ – положительные действительные числа, определяемые однозначно с точностью до порядка.




Доказательство. Определим оператор $\mathcal{A}: F^n \rightarrow F^k$ таким правилом: $\mathcal{A}\mathbf{x} := M\mathbf{x}$. По теореме в F^n и F^k есть ортонормированные базисы, скажем, B_n и B_k , в которых матрица A оператора \mathcal{A} имеет вид $(\#)$. С другой стороны, M есть матрица оператора \mathcal{A} в стандартных ортонормированных базисах пространств F^n и F^k . Обозначим через R матрицу перехода от стандартного базиса пространства F^k к базису B_k , а через S матрицу перехода от базиса B_n к стандартному базису пространства F^n . Тогда матрицы R и S ортогональные (унитарные), и по формуле замены матрицы оператора $M = RAS$. □

Следствие (SVD, Джеймс Джозеф Сильвестр, 1889)

Пусть F – одно из полей \mathbb{R} или \mathbb{C} , а M – произвольная $k \times n$ -матрица над F . Существует пара ортогональных (унитарных) матриц $R \in M_k(F)$ и $S \in M_n(F)$ такая, что $M = RAS$, где A – матрица вида $(\#)$, где r – ранг матрицы M , а $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ – положительные действительные числа, определяемые однозначно с точностью до порядка.



Доказательство. Определим оператор $\mathcal{A}: F^n \rightarrow F^k$ таким правилом: $\mathcal{A}\mathbf{x} := M\mathbf{x}$. По теореме в F^n и F^k есть ортонормированные базисы, скажем, B_n и B_k , в которых матрица A оператора \mathcal{A} имеет вид $(\#)$. С другой стороны, M есть матрица оператора \mathcal{A} в стандартных ортонормированных базисах пространств F^n и F^k . Обозначим через R матрицу перехода от стандартного базиса пространства F^k к базису B_k , а через S матрицу перехода от базиса B_n к стандартному базису пространства F^n . Тогда матрицы R и S ортогональные (унитарные), и по формуле замены матрицы оператора $M = RAS$. □

Замечание. Речь идет о формуле $A_Q = T_{Q \rightarrow P} A_P T_{P \rightarrow Q}$ из §III.1. Мы ее доказали для операторов на одном пространстве, но она справедлива (с тем же доказательством) для операторов из пространства U в пространство V , если под P и Q понимать **пары** (базис U , базис V).




$$\mathbf{M} = \mathbf{R} \quad \mathbf{A} \quad \mathbf{S}$$

$$m \times n \quad m \times m \quad m \times n \quad n \times n$$



1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	0	0	1

$$\mathbf{R}^* = \mathbf{E}_m$$



1	0	0
0	1	0
0	0	1

$$\mathbf{S}^* \quad \mathbf{S} = \mathbf{E}_n$$

Полярное разложение из предыдущей лекции легко получается из SVD.

Полярное разложение из предыдущей лекции легко получается из SVD.

Действительно, пусть M – произвольная квадратная матрица над одним из полей \mathbb{R} или \mathbb{C} .

Полярное разложение из предыдущей лекции легко получается из SVD.

Действительно, пусть M – произвольная квадратная матрица над одним из полей \mathbb{R} или \mathbb{C} . По SVD имеем $M = RAS$, где A – матрица вида $(\#)$, а R и S – ортогональные (унитарные) матрицы.

Полярное разложение из предыдущей лекции легко получается из SVD.

Действительно, пусть M – произвольная квадратная матрица над одним из полей \mathbb{R} или \mathbb{C} . По SVD имеем $M = RAS$, где A – матрица вида $(\#)$, а R и S – ортогональные (унитарные) матрицы. Тогда $M = (RS)(S^{-1}AS)$, матрица RS ортогональна (унитарна), а $S^{-1}AS$ – неотрицательная симметрическая (эрмитова) матрица.

Полярное разложение из предыдущей лекции легко получается из SVD.

Действительно, пусть M – произвольная квадратная матрица над одним из полей \mathbb{R} или \mathbb{C} . По SVD имеем $M = RAS$, где A – матрица вида $(\#)$, а R и S – ортогональные (унитарные) матрицы. Тогда $M = (RS)(S^{-1}AS)$, матрица RS ортогональна (унитарна), а $S^{-1}AS$ – неотрицательная симметрическая (эрмитова) матрица.

Итак, каждая квадратная действительная (комплексная) матрица представима в виде произведения ортогональной (унитарной) и симметрической (эрмитовой) матриц.

Полярное разложение из предыдущей лекции легко получается из SVD.

Действительно, пусть M – произвольная квадратная матрица над одним из полей \mathbb{R} или \mathbb{C} . По SVD имеем $M = RAS$, где A – матрица вида $(\#)$, а R и S – ортогональные (унитарные) матрицы. Тогда $M = (RS)(S^{-1}AS)$, матрица RS ортогональна (унитарна), а $S^{-1}AS$ – неотрицательная симметрическая (эрмитова) матрица.

Итак, каждая квадратная действительная (комплексная) матрица представима в виде произведения ортогональной (унитарной) и симметрической (эрмитовой) матриц.

На операторном языке это означает, что любой линейный оператор \mathcal{A} на евклидовом (унитарном) пространстве представим в виде $\mathcal{A} = \mathcal{B}\mathcal{U}$, где \mathcal{B} – неотрицательный оператор, а \mathcal{U} – ортогональный (унитарный) оператор.

Напомним, что в конце осеннего семестра мы построили для каждого линейного оператора $\mathcal{A}: U \rightarrow V$ пространств со скалярным произведением **псевдообратный** оператор $\mathcal{A}^+: V \rightarrow U$, возвращающий нормальное псевдорешение произвольной системы линейных уравнений $Ax = b$ с матрицей A , соответствующей \mathcal{A} , по правой части b этой системы.

Напомним, что в конце осеннего семестра мы построили для каждого линейного оператора $\mathcal{A}: U \rightarrow V$ пространств со скалярным произведением **псевдообратный** оператор $\mathcal{A}^+: V \rightarrow U$, возвращающий нормальное псевдорешение произвольной системы линейных уравнений $Ax = b$ с матрицей A , соответствующей \mathcal{A} , по правой части b этой системы.

Псевдообратный оператор характеризуется **тождествами Пенроуза**:

$$(\mathcal{A}\mathcal{A}^+)^* = \mathcal{A}\mathcal{A}^+ \quad (1),$$

$$\mathcal{A}\mathcal{A}^+\mathcal{A} = \mathcal{A} \quad (3),$$

$$(\mathcal{A}^+\mathcal{A})^* = \mathcal{A}^+\mathcal{A} \quad (2),$$

$$\mathcal{A}^+\mathcal{A}\mathcal{A}^+ = \mathcal{A}^+ \quad (4).$$

Напомним, что в конце осеннего семестра мы построили для каждого линейного оператора $\mathcal{A}: U \rightarrow V$ пространств со скалярным произведением **псевдообратный** оператор $\mathcal{A}^+: V \rightarrow U$, возвращающий нормальное псевдорешение произвольной системы линейных уравнений $Ax = b$ с матрицей A , соответствующей \mathcal{A} , по правой части b этой системы.

Псевдообратный оператор характеризуется **тождествами Пенроуза**:

$$(\mathcal{A}\mathcal{A}^+)^* = \mathcal{A}\mathcal{A}^+ \quad (1),$$

$$\mathcal{A}\mathcal{A}^+\mathcal{A} = \mathcal{A} \quad (3),$$

$$(\mathcal{A}^+\mathcal{A})^* = \mathcal{A}^+\mathcal{A} \quad (2),$$

$$\mathcal{A}^+\mathcal{A}\mathcal{A}^+ = \mathcal{A}^+ \quad (4).$$

Зная SVD матрицы, легко построить псевдообратную к ней.

Напомним, что в конце осеннего семестра мы построили для каждого линейного оператора $\mathcal{A}: U \rightarrow V$ пространств со скалярным произведением **псевдообратный** оператор $\mathcal{A}^+: V \rightarrow U$, возвращающий нормальное псевдорешение произвольной системы линейных уравнений $Ax = b$ с матрицей A , соответствующей \mathcal{A} , по правой части b этой системы.

Псевдообратный оператор характеризуется **тождествами Пенроуза**:

$$(\mathcal{A}\mathcal{A}^+)^* = \mathcal{A}\mathcal{A}^+ \quad (1),$$

$$\mathcal{A}\mathcal{A}^+\mathcal{A} = \mathcal{A} \quad (3),$$

$$(\mathcal{A}^+\mathcal{A})^* = \mathcal{A}^+\mathcal{A} \quad (2),$$

$$\mathcal{A}^+\mathcal{A}\mathcal{A}^+ = \mathcal{A}^+ \quad (4).$$

Зная SVD матрицы, легко построить псевдообратную к ней.

Для простоты формулировок ограничимся евклидовым случаем.

Напомним, что в конце осеннего семестра мы построили для каждого линейного оператора $\mathcal{A}: U \rightarrow V$ пространств со скалярным произведением **псевдообратный** оператор $\mathcal{A}^+: V \rightarrow U$, возвращающий нормальное псевдорешение произвольной системы линейных уравнений $Ax = b$ с матрицей A , соответствующей \mathcal{A} , по правой части b этой системы.

Псевдообратный оператор характеризуется *тождествами Пенроуза*:

$$(\mathcal{A}\mathcal{A}^+)^* = \mathcal{A}\mathcal{A}^+ \quad (1),$$

$$\mathcal{A}\mathcal{A}^+\mathcal{A} = \mathcal{A} \quad (3),$$

$$(\mathcal{A}^+\mathcal{A})^* = \mathcal{A}^+\mathcal{A} \quad (2),$$

$$\mathcal{A}^+\mathcal{A}\mathcal{A}^+ = \mathcal{A}^+ \quad (4).$$

Зная SVD матрицы, легко построить псевдообратную к ней.

Для простоты формулировок ограничимся евклидовым случаем.
(В унитарном случае нужно только поменять T на * .)

Напомним, что в конце осеннего семестра мы построили для каждого линейного оператора $\mathcal{A}: U \rightarrow V$ пространств со скалярным произведением **псевдообратный** оператор $\mathcal{A}^+: V \rightarrow U$, возвращающий нормальное псевдорешение произвольной системы линейных уравнений $Ax = b$ с матрицей A , соответствующей \mathcal{A} , по правой части b этой системы.

Псевдообратный оператор характеризуется **тождествами Пенроуза**:

$$(\mathcal{A}\mathcal{A}^+)^* = \mathcal{A}\mathcal{A}^+ \quad (1),$$

$$\mathcal{A}\mathcal{A}^+\mathcal{A} = \mathcal{A} \quad (3),$$

$$(\mathcal{A}^+\mathcal{A})^* = \mathcal{A}^+\mathcal{A} \quad (2),$$

$$\mathcal{A}^+\mathcal{A}\mathcal{A}^+ = \mathcal{A}^+ \quad (4).$$

Зная SVD матрицы, легко построить псевдообратную к ней.

Для простоты формулировок ограничимся евклидовым случаем.
(В унитарном случае нужно только поменять T на * .)

Предложение (псевдообратная матрица через SVD)

Пусть $M - k \times n$ -матрица ранга r над полем \mathbb{R} , а $M = RAS$ – ее SVD, где $A - k \times n$ -матрица вида $(\#)$ с ненулевыми числами $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_r$ на диагонали. Тогда $M^+ = S^T A^+ R^T$, где $A^+ - n \times k$ -матрица вида $(\#)$ с ненулевыми числами $\mu_1^{-1}, \mu_2^{-1}, \dots, \mu_r^{-1}$ на диагонали.

Итак, чтобы найти псевдообратную матрицу по SVD данной матрицы, надо транспонировать SVD и обратить сингулярные числа.

Итак, чтобы найти псевдообратную матрицу по SVD данной матрицы, надо транспонировать SVD и обратить сингулярные числа.

$$M = R \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_r & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} S$$

Приложения SVD: псевдообратный оператор (2)

Итак, чтобы найти псевдообратную матрицу по SVD данной матрицы, надо транспонировать SVD и обратить сингулярные числа.

$$M = R \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_r & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} S \implies M^+ = S^T \begin{pmatrix} \mu_1^{-1} & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2^{-1} & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_r^{-1} & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} R^T$$

Итак, чтобы найти псевдообратную матрицу по SVD данной матрицы, надо транспонировать SVD и обратить сингулярные числа.

$$M = R \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_r & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} S \implies M^+ = S^T \begin{pmatrix} \mu_1^{-1} & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2^{-1} & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_r^{-1} & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} R^T$$

Чтобы убедиться, что формула $M^+ = S^T A^+ R^T$ действительно возвращает псевдообратную матрицу, достаточно подставить выражение $S^T A^+ R^T$ в тождества (1)–(4) и проверить, что они выполняются.

Итак, чтобы найти псевдообратную матрицу по SVD данной матрицы, надо транспонировать SVD и обратить сингулярные числа.

$$M = R \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_r & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} S \implies M^+ = S^T \begin{pmatrix} \mu_1^{-1} & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2^{-1} & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_r^{-1} & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} R^T$$

Чтобы убедиться, что формула $M^+ = S^T A^+ R^T$ действительно возвращает псевдообратную матрицу, достаточно подставить выражение $S^T A^+ R^T$ в тождества (1)–(4) и проверить, что они выполняются.
Например, проверим равенство $MM^+M = M$:

$$\underbrace{RAS}_M \quad \underbrace{S^T A^+ R^T}_{\text{кандидат в } M^+} \quad \underbrace{RAS}_M$$

Итак, чтобы найти псевдообратную матрицу по SVD данной матрицы, надо транспонировать SVD и обратить сингулярные числа.

$$M = R \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_r & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} S \implies M^+ = S^T \begin{pmatrix} \mu_1^{-1} & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2^{-1} & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_r^{-1} & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} R^T$$

Чтобы убедиться, что формула $M^+ = S^T A^+ R^T$ действительно возвращает псевдообратную матрицу, достаточно подставить выражение $S^T A^+ R^T$ в тождества (1)–(4) и проверить, что они выполняются.
Например, проверим равенство $MM^+M = M$:

$$\underbrace{RAS}_M \underbrace{S^T A^+ R^T}_{\text{кандидат в } M^+} \underbrace{RAS}_M = RAS \overbrace{S^T}^E A^+ \overbrace{R^T}^E RAS = RAA^+AS$$

Итак, чтобы найти псевдообратную матрицу по SVD данной матрицы, надо транспонировать SVD и обратить сингулярные числа.

$$M = R \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_r & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} S \implies M^+ = S^T \begin{pmatrix} \mu_1^{-1} & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \mu_2^{-1} & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mu_r^{-1} & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} R^T$$

Чтобы убедиться, что формула $M^+ = S^T A^+ R^T$ действительно возвращает псевдообратную матрицу, достаточно подставить выражение $S^T A^+ R^T$ в тождества (1)–(4) и проверить, что они выполняются.
Например, проверим равенство $MM^+M = M$:

$$\underbrace{RAS}_M \underbrace{S^T A^+ R^T}_{\text{кандидат в } M^+} \underbrace{RAS}_M = RAS \overbrace{S^T}^E A^+ \overbrace{R^T}^E RAS = RAA^+AS = RAS = M.$$

В многих практических задачах (сжатие данных, обработка сигналов, метод главных компонент, латентно-семантическое индексирование и т.д.) нужно приблизить матрицу M некоторой другой матрицей M_d с заранее заданным рангом d .

В многих практических задачах (сжатие данных, обработка сигналов, метод главных компонент, латентно-семантическое индексирование и т.д.) нужно приблизить матрицу M некоторой другой матрицей M_d с заранее заданным рангом d . При этом стремятся минимизировать $|M - M_d|^2$.

В многих практических задачах (сжатие данных, обработка сигналов, метод главных компонент, латентно-семантическое индексирование и т.д.) нужно приблизить матрицу M некоторой другой матрицей M_d с заранее заданным рангом d . При этом стремятся минимизировать $|M - M_d|^2$. (Под длиной матрицы здесь понимается длина ее [векторизации](#).)

В многих практических задачах (сжатие данных, обработка сигналов, метод главных компонент, латентно-семантическое индексирование и т.д.) нужно приблизить матрицу M некоторой другой матрицей M_d с заранее заданным рангом d . При этом стремятся минимизировать $|M - M_d|^2$. (Под длиной матрицы здесь понимается длина ее [векторизации](#).)

Теорема (Карл Эккарт, Гейл Янг, 1936)

Пусть M — $k \times n$ -матрица ранга r над полем \mathbb{R} , а $M = RAS$ — ее SVD, где A — $k \times n$ -матрица вида $(\#)$ с числами $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_r$ на диагонали, и пусть $d < r$. Тогда матрица M_d ранга d с наименьшей возможной величиной $|M - M_d|^2$ получается как $M_d := R_d A_d S_d$, где A_d — диагональная $d \times d$ -матрица с числами $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_d$ на диагонали, R_d — $k \times d$ -матрица, образованная первыми d столбцами матрицы R , а S_d — $d \times n$ -матрица, образованная первыми d строками матрицы S .

В многих практических задачах (сжатие данных, обработка сигналов, метод главных компонент, латентно-семантическое индексирование и т.д.) нужно приблизить матрицу M некоторой другой матрицей M_d с заранее заданным рангом d . При этом стремятся минимизировать $|M - M_d|^2$. (Под длиной матрицы здесь понимается длина ее [векторизации](#).)

Теорема (Карл Эккарт, Гейл Янг, 1936)

Пусть M — $k \times n$ -матрица ранга r над полем \mathbb{R} , а $M = RAS$ — ее SVD, где A — $k \times n$ -матрица вида $(\#)$ с числами $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_r$ на диагонали, и пусть $d < r$. Тогда матрица M_d ранга d с наименьшей возможной величиной $|M - M_d|^2$ получается как $M_d := R_d A_d S_d$, где A_d — диагональная $d \times d$ -матрица с числами $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_d$ на диагонали, R_d — $k \times d$ -матрица, образованная первыми d столбцами матрицы R , а S_d — $d \times n$ -матрица, образованная первыми d строками матрицы S .

Итак, нужно оставить d первых сингулярных чисел, а остальные занулить.