

§ 5. Фундаментальный набор решений однородной системы линейных уравнений

Б.М.Верников

Уральский федеральный университет,
Институт естественных наук и математики,
кафедра алгебры и фундаментальной информатики

Пусть дана однородная система линейных уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (1)$$

над полем F . Множество всех решений этой системы образует, как мы знаем, подпространство пространства F^n , называемое пространством решений системы (1). Основной целью данного параграфа является доказательство теоремы о размерности этого пространства. В ходе доказательства будет указан способ построения базиса пространства решений.

Теорема 5.1

Размерность пространства решений системы (1) равна $n - r$, где n — число неизвестных в системе, а r — ранг основной матрицы системы.

Доказательство. Обозначим через A основную матрицу системы (1). В силу теоремы о ранге матрицы ранг A по строкам равен r , и потому в A есть r линейно независимых векторов-строк, а любой набор из более, чем r ее векторов-строк линейно зависим. Для удобства обозначений будем считать, что первые r векторов-строк матрицы A линейно независимы. Если к этим векторам-строкам добавить любую из последующих векторов-строк матрицы A , полученный набор векторов-строк будет линейно зависим. В силу леммы 1.4 все векторы-строки, начиная с $(r+1)$ -й, являются линейными комбинациями первых r векторов-строк. Следовательно, все уравнения системы (1), начиная с $(r+1)$ -го, являются следствиями первых r уравнений. Вычеркнув все уравнения, начиная с $(r+1)$ -го, получим систему

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \cdots + a_{rn}x_n = 0, \end{cases} \quad (2)$$

равносильную системе (1). Обозначим основную матрицу системы (2) через A' . Ясно, что ранг матрицы A' по строкам равен r . В силу теоремы о ранге матрицы, ее ранг по столбцам также равен r . Следовательно, $r \leq n$.

Размерность пространства решений однородной системы (3)

Вновь используя теорему о ранге матрицы, получаем, что ранг A' по минорам равен r . Следовательно, в A' есть ненулевой минор порядка r . Обозначим его через d и будем без ограничения общности считать, что он расположен в первых r столбцах (и, разумеется, всех r строках) матрицы A' .

Предположим сначала, что $r = n$. Тогда (2) — крамеровская однородная система, определитель которой равен d и потому отличен от 0. По теореме Крамера она имеет единственное решение. Поскольку эта система однородна, ее единственным решением является нулевое решение.

Следовательно, пространство решений системы (2) является нулевым.

Поскольку системы (1) и (2) равносильны, пространство решений системы (1) также является нулевым. Размерность нулевого пространства равна 0, а поскольку $r = n$, то и $n - r = 0$. Таким образом, в рассматриваемом случае заключение теоремы верно.

Пусть теперь $r < n$. Перенеся неизвестные x_{r+1}, \dots, x_n в правую часть, получим систему

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1r}x_r = -a_{1r+1}x_{r+1} - \cdots - a_{1n}x_n, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2r}x_r = -a_{2r+1}x_{r+1} - \cdots - a_{2n}x_n, \\ \dots \\ a_{rr}x_r = -a_{rr+1}x_{r+1} - \cdots - a_{rn}x_n. \end{array} \right. \quad (3)$$

Размерность пространства решений однородной системы (4)

Присвоим неизвестным x_{r+1}, \dots, x_n произвольные значения: $x_{r+1} = x_{r+1}^0, \dots, x_n = x_n^0$. Тогда система (3) примет вид

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1r}x_r = -a_{1r+1}x_{r+1}^0 - \cdots - a_{1n}x_n^0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2r}x_r = -a_{2r+1}x_{r+1}^0 - \cdots - a_{2n}x_n^0, \\ \dots \\ a_{rr}x_1 + a_{r2}x_2 + \cdots + a_{rr}x_r = -a_{rr+1}x_{r+1}^0 - \cdots - a_{rn}x_n^0. \end{array} \right. \quad (4)$$

Последняя система является крамеровской, а ее определитель равен d , а значит, отличен от 0. По теореме Крамера система (4) имеет единственное решение: $x_1 = x_1^0, x_2 = x_2^0, \dots, x_r = x_r^0$. Ясно, что $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ — решение системы (3), а значит и системы (1). Итак, неизвестные x_{r+1}, \dots, x_n могут принимать любые значения, а значения остальных неизвестных однозначно вычисляются исходя из значений этих $n - r$ неизвестных. Это означает, что неизвестные x_{r+1}, \dots, x_n и только они являются свободными.

Выберем произвольную свободную неизвестную x_i (разумеется, $r + 1 \leq i \leq n$) и приравняем в системе (3) x_i к 1, а все остальные свободные неизвестные к 0. В силу сказанного выше полученная система будем иметь единственное решение, которое мы обозначим через $(f_{i1}, f_{i2}, \dots, f_{ir})$. Тогда набор скаляров $(f_{i1}, f_{i2}, \dots, f_{ir}, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, где 1 стоит на i -м месте, является решением системы (3).

В итоге мы получим следующий набор решений этой системы:

$$\mathbf{f}_1 = (f_{11}, f_{12}, \dots, f_{1r}, 1, 0, \dots, 0),$$

$$\mathbf{f}_2 = (f_{21}, f_{22}, \dots, f_{2r}, 0, 1, \dots, 0),$$

.....

$$\mathbf{f}_{n-r} = (f_{n-r1}, f_{n-r2}, \dots, f_{n-rr}, 0, 0, \dots, 1).$$

Докажем, что решения $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_{n-r}$ образуют базис пространства решений системы (3), а следовательно и пространства решений системы (1). Поскольку число этих решений равно $n - r$, тем самым доказательство теоремы будет завершено. Запишем векторы $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_{n-r}$ в матрицу по строкам и обозначим эту матрицу через F . Ясно, что на пересечении всех строк матрицы F и последних $n - r$ ее столбцов стоит единичная матрица. Следовательно, матрица F имеет ненулевой минор порядка $n - r$. Миноров большего порядка в матрице F нет. Следовательно, ее ранг по минорам равен $n - r$. В силу теоремы о ранге матрицы, ранг F по строкам также равен $n - r$. Поскольку число строк этой матрицы равно $n - r$, все ее векторы-строки, т. е. векторы $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_{n-r}$, линейно независимы. В силу леммы 2.1 осталось показать, что всякое решение системы (1) есть линейная комбинация векторов $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_{n-r}$. Пусть $\mathbf{h} = (h_1, h_2, \dots, h_n)$ — произвольное решение системы (3).

Размерность пространства решений однородной системы (6)

Рассмотрим вектор $\mathbf{g} = h_{r+1}\mathbf{f}_1 + h_{r+2}\mathbf{f}_2 + \cdots + h_n\mathbf{f}_{n-r} - \mathbf{h}$. Непосредственно проверяется, что все компоненты вектора \mathbf{g} , начиная с $(r+1)$ -й, равны 0. В силу теоремы 6.1 курса «Основы алгебры» вектор \mathbf{g} является решением системы (1). Поскольку последние $n-r$ компонент вектора \mathbf{g} равны нулю, первые r компонент этого вектора должны удовлетворять следующей системе линейных уравнений, которая получается из системы (2), если положить $x_{r+1} = x_{r+2} = \cdots = x_n = 0$:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1r}x_r = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2r}x_r = 0, \\ \dots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \cdots + a_{rr}x_r = 0. \end{cases} \quad (5)$$

Эта система является крамеровской, а ее определитель равен d и потому отличен от 0. По теореме Крамера система (5) имеет единственное решение. Поскольку эта система однородна, ее единственным решением является нулевое решение. Таким образом, первые r компонент вектора \mathbf{g} , как и последние $n-r$ его компонент, равны 0. Следовательно, $\mathbf{g} = \mathbf{0}$ и потому $\mathbf{h} = h_{r+1}\mathbf{f}_1 + h_{r+2}\mathbf{f}_2 + \cdots + h_n\mathbf{f}_{n-r}$. Итак, произвольное решение системы (3) является линейной комбинацией векторов $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_{n-r}$. Мы доказали, что векторы $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_{n-r}$ образуют базис пространства решений системы (3). Это завершает доказательство теоремы.



Определение

Базис пространства решений однородной системы линейных уравнений называется *фундаментальным набором решений* этой системы.

Если однородная система имеет единственное решение, то это решение является нулевым, а значит, пространство решений этой системы является нулевым пространством. Как отмечалось в § 2, нулевое векторное пространство не имеет базиса. Таким образом, справедливо следующее

Замечание 5.1

Если однородная система линейных уравнений имеет единственное решение, то фундаментального набора решений этой системы не существует.

Если же однородная система является неопределенной, то, найдя ее фундаментальный набор решений, мы, фактически, найдем все ее решения, поскольку, по теореме о разложении вектора по базису, любое решение системы является линейной комбинацией решений, входящих в фундаментальный набор решений.

Число векторов в фундаментальном наборе решений и число свободных переменных

Согласно замечанию 7.2 курса «Основы алгебры», если система линейных уравнений является неопределенной, то число ее свободных переменных равно $n - r$, где n — число неизвестных в системе, а r — число ненулевых строк в матрице, полученной из расширенной матрицы системы приведением к ступенчатому виду. Сопоставляя этот факт с алгоритмом 4.1 и теоремой 5.1, мы получаем следующий факт, полезный при решении конкретных систем линейных уравнений.

Замечание 5.2

Если однородная система линейных уравнений является неопределенной, то число векторов в фундаментальном наборе решений этой системы равно числу ее свободных переменных.



О нахождении фундаментального набора решений (1)

Предположим, что мы решаем систему линейных уравнений с n неизвестными, из которых r первых являются связанными, а $n - r$ последних — свободными. В силу замечания 5.2 фундаментальный набор решений нашей системы состоит из $n - r$ векторов. Обозначим входящие в нее векторы через $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_{n-r}$. Чтобы найти эти векторы, мы должны заполнить табл. 1. В этой таблице свободные переменные выделены красным цветом, а соответствующие им клетки таблицы — зеленым.

Табл. 1. Таблица для фундаментального набора решений

	x_1	x_2	...	x_r	x_{r+1}	x_{r+2}	...	x_n
\mathbf{f}_1								
\mathbf{f}_2								
.....				
\mathbf{f}_{n-r}								

О нахождении фундаментального набора решений (2)

В доказательстве теоремы 5.1 «зеленые» клетки из табл. 1 заполнялись так, как указано в табл. 2.

Табл. 2. Нахождение фундаментального набора решений

	x_1	x_2	...	x_r	x_{r+1}	x_{r+2}	...	x_n
f_1					1	0	...	0
f_2					0	1	...	0
.....
f_{n-r}					0	0	...	1

Иными словами, на место квадратной матрицы, которую образуют эти зеленые клетки, вписывалась единичная матрица. Иногда при решении конкретных систем буквальное следование этому алгоритму может привести к достаточно громоздким вычислениям. Поэтому полезно иметь в виду следующее замечание.

- На место квадратной матрицы, соответствующей свободным переменным, можно вписывать не только единичную матрицу, но и произвольную невырожденную квадратную матрицу порядка $n - r$.

О нахождении фундаментального набора решений (3)

В самом деле, это гарантирует наличие в матрице размера $(n - r) \times n$, в которой по строкам записаны векторы $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_{n-r}$, ненулевого минора порядка $n - r$. Следовательно, ранг этой матрицы по минорам равен $n - r$. В силу теоремы о ранге, ее ранг по строкам тоже равен $n - r$. Это означает, что все векторы-строки нашей матрицы, т. е. векторы $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_{n-r}$, линейно независимы. Эти векторы являются решениями исходной однородной системы. По теореме 5.1 их число равно размерности пространства решений этой системы. Из замечания 2.7 вытекает, что они образуют базис пространства ее решений.

Векторная запись общего решения системы линейных уравнений

Знание фундаментального набора решений однородной системы позволяет записать ее общее решение в векторном виде. А именно, если $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_k$ — фундаментальный набор решений (т. е. базис пространства решений) однородной системы, то общее решение системы совпадает с множеством всех векторов вида $c_1\mathbf{f}_1 + c_2\mathbf{f}_2 + \dots + c_k\mathbf{f}_k$, где c_1, c_2, \dots, c_k — произвольные скаляры. Более того, сказанное выше позволяет находить общее решение и неоднородной системы линейных уравнений. В самом деле, предположим, что нам дана произвольная неопределенная система линейных уравнений. Предположим, что $\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_k$ — фундаментальный набор решений соответствующей однородной системы. Предположим также, что мы нашли (например, с помощью метода Гаусса) одно частное решение \mathbf{f}_0 заданной неоднородной системы. В силу теоремы 6.1 курса «Основы алгебры» общее решение этой системы совпадает с множеством всех векторов вида

$$\mathbf{f}_0 + c_1\mathbf{f}_1 + c_2\mathbf{f}_2 + \dots + c_k\mathbf{f}_k.$$

Это выражение называется *векторной записью общего решения системы линейных уравнений*.