

Глава III. Евклидовы и унитарные пространства

§ 12. Скалярное произведение в векторном пространстве

Б.М.Верников

Уральский федеральный университет,
Институт естественных наук и математики,
кафедра алгебры и фундаментальной информатики

12.1. Определение, примеры и простейшие свойства скалярного произведения

Напомним, что если $\alpha \in \mathbb{C}$, то через $\bar{\alpha}$ обозначается число, комплексно сопряженное к α .

Определения

Пусть F — одно из полей \mathbb{R} и \mathbb{C} , а V — векторное пространство над F . Пространство V называется *пространством со скалярным произведением*, если задано отображение из $V \times V$ в F , которое любой упорядоченной паре векторов $x, y \in V$ ставит в соответствие число из F , называемое *скалярным произведением* этих векторов и обозначаемое через xu или (x, y) , так, что выполнены следующие условия, называемые *аксиомами скалярного произведения*:

- 1) для любых $x, y \in V$: $xu = \overline{yx}$;
- 2) для любых $x, y \in V$ и любого $\alpha \in F$: $(\alpha x)y = \alpha(xy)$;
- 3) для любых $x, y, z \in V$: $(x + y)z = xz + yz$ (скалярное произведение *дистрибутивно относительно сложения векторов*);
- 4) для любого $x \in V$: $xx \geq 0$, причем $xx = 0$ тогда и только тогда, когда $x = 0$.

Определения

Пространство со скалярным произведением называется *евклидовым*, если $F = \mathbb{R}$, и *унитарным*, если $F = \mathbb{C}$.

- Как и «обычное» скалярное произведение в трехмерном пространстве, скалярное произведение в векторном пространстве не является алгебраической операцией (в смысле определения операции из § 4 курса «Основы алгебры»), поскольку его результатом является число, а не вектор.
- Если $F = \mathbb{R}$, то аксиома 1) означает, что $xu = ux$. Иными словами, *скалярное произведение в евклидовом пространстве коммутативно*.
- Хотя для комплексного числа α соотношение $\alpha \geq 0$, вообще говоря, не имеет смысла (поскольку на множестве всех комплексных чисел нет естественного отношения порядка), аксиома 4) имеет смысл не только в евклидовом, но и в унитарном пространстве. В самом деле, из аксиомы 1) вытекает, что $xx = \overline{xx}$, и потому $xx \in \mathbb{R}$ для любого $x \in V$ даже в случае, когда $F = \mathbb{C}$.

Примеры пространств со скалярным произведением (1)

Пример 1. Множество всех векторов обычного трехмерного пространства с обычным скалярным произведением является евклидовым пространством, так как все аксиомы 1)–4) в этом случае выполнены. То же самое можно сказать и о множестве всех векторов на плоскости с обычным скалярным произведением.

Следующий пример, в сочетании с примером 1, показывает, что в одном и том же векторном пространстве скалярное произведение можно вводить разными способами.

Пример 2. На множестве всех векторов на плоскости введем следующую операцию \bullet : если векторы \vec{x} и \vec{y} этой плоскости имеют в некотором базисе координаты (x_1, x_2) и (y_1, y_2) соответственно, то

$$\vec{x} \bullet \vec{y} = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 2x_2 y_2.$$

Несложно проверить, что все аксиомы евклидова пространства будут при этом выполнены, и потому множество векторов на плоскости с указанной операцией является евклидовым пространством.

Пример 3. Ясно, что нулевое векторное пространство над полем \mathbb{R} [соответственно \mathbb{C}] станет евклидовым [унитарным], если мы определим скалярное произведение правилом $\mathbf{0} \cdot \mathbf{0} = 0$.

Пример 4. Рассмотрим векторное пространство $\mathbb{R}[x]$ всех многочленов над полем \mathbb{R} . Для произвольных многочленов $f, g \in \mathbb{R}[x]$ положим

$f \circ g = \int_0^1 f(t)g(t)dt$. Нетрудно убедиться, что эта операция удовлетворяет аксиомам 1)–4). Это означает, что $\mathbb{R}[x]$ превращается в евклидово пространство. Точно таким же образом можно ввести скалярное произведение в пространстве всех многочленов степени $\leq n$ над полем \mathbb{R} .

Следующий пример показывает, что операцию скалярного произведения можно ввести в произвольном конечномерном векторном пространстве над полем \mathbb{R} или \mathbb{C} .

Пример 5. Пусть V — произвольное ненулевое конечномерное векторное пространство над полем \mathbb{R} или \mathbb{C} , а $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ — его базис. Пусть $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$. Обозначим координаты векторов \mathbf{x} и \mathbf{y} в базисе $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ через $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ и $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ соответственно. Положим

$$\mathbf{x}\mathbf{y} = \alpha_1\overline{\beta_1} + \alpha_2\overline{\beta_2} + \dots + \alpha_n\overline{\beta_n}. \quad (1)$$

Простая проверка показывает, что аксиомы 1)–4) в этом случае также выполняются. Следовательно, пространство V с введенной операцией является пространством со скалярным произведением. Если V — пространство над \mathbb{R} , то равенство (1) можно переписать в более простом виде:

$$\mathbf{x}\mathbf{y} = \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \dots + \alpha_n\beta_n.$$

Укажем несколько простых следствий из аксиом скалярного произведения. Аксиома 2) утверждает, что скалярный множитель можно выносить за скобки от первого сомножителя. В действительности, его можно выносить и от второго сомножителя, но при этом его надо сопрягать. Более точно,

$$x(\alpha y) = \overline{\alpha}(xy) \quad (2)$$

для любых $x, y \in V$ и $\alpha \in F$. В самом деле, используя аксиомы 1) и 2) и свойства комплексно сопряженных чисел, указанные в §5 курса «Основы алгебры», имеем

$$x(\alpha y) = \overline{(\alpha y)x} = \overline{\alpha(yx)} = \overline{\alpha} \cdot \overline{yx} = \overline{\alpha} \cdot \overline{xy} = \overline{\alpha}(xy).$$

Если $F = \mathbb{R}$, то формула (2) принимает более простой вид: $x(\alpha y) = \alpha(xy)$.

Аналогичное замечание можно сделать об аксиоме 3): скалярное произведение дистрибутивно относительно сложения не только по первому, но и по второму аргументу. В самом деле, используя аксиомы 1) и 3), имеем

$$x(y + z) = \overline{(y + z)x} = \overline{yx + zx} = \overline{yx} + \overline{zx} = \overline{yx} + \overline{zx} = xy + xz.$$

Далее, для любого вектора $x \in V$ выполнены равенства

$$\mathbf{0} \cdot x = x \cdot \mathbf{0} = 0, \quad (3)$$

поскольку $\mathbf{0} \cdot x = (\mathbf{0} \cdot x)x = \mathbf{0} \cdot (xx) = 0$ и $x \cdot \mathbf{0} = \overline{\mathbf{0} \cdot x} = \overline{0} = 0$.

Предложение 12.1 (ослабленный закон сокращения в пространстве со скалярным произведением)

Если V — пространство со скалярным произведением, а векторы $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ таковы, что для любого вектора $\mathbf{x} \in V$ выполняется равенство $\mathbf{ax} = \mathbf{bx}$, то $\mathbf{a} = \mathbf{b}$. То же заключение верно, если для любого вектора $\mathbf{x} \in V$ выполняется равенство $\mathbf{xa} = \mathbf{xb}$.

Доказательство. Докажем первое утверждение. Из условия вытекает, что $(\mathbf{a} - \mathbf{b})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ для любого $\mathbf{x} \in V$. Полагая в этом равенстве $\mathbf{x} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$, имеем $(\mathbf{a} - \mathbf{b})(\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$. В силу аксиомы 4) отсюда вытекает, что $\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$, т. е. $\mathbf{a} = \mathbf{b}$. Второе утверждение доказывается аналогично. \square

Это утверждение обобщает одноименное свойство для «геометрических» векторов в трехмерном пространстве, доказанное в курсе аналитической геометрии. Отметим еще, что в § 14 курса «Основы алгебры» был доказан аналог предложения 12.1 для произведения матриц (см. предложение 15.1 в этом параграфе).

Определение

Скалярное произведение вектора x на себя называется *скалярным квадратом* вектора x и обозначается через x^2 .

Аксиома 4) позволяет дать следующее

Определение

Длиной вектора x называется число \sqrt{xx} , обозначаемое через $|x|$.

Это определение представляется естественным, так как в обычном пространстве длина вектора также равна корню квадратному из его скалярного квадрата. Как мы увидим ниже, на пространства со скалярным произведением переносятся и многие другие свойства, связанные с длинами векторов в обычном пространстве. В частности, легко понять, что если $\alpha \in F$, то

$$|\alpha x| = |\alpha| \cdot |x|. \quad (4)$$

В самом деле, $\alpha \bar{\alpha} = |\alpha|^2$, и потому

$$|\alpha x| = \sqrt{(\alpha x)(\alpha x)} = \sqrt{\alpha \bar{\alpha}(xx)} = \sqrt{|\alpha|^2(xx)} = \sqrt{|\alpha|^2} \cdot \sqrt{xx} = |\alpha| \cdot |x|.$$

Отсюда вытекает

Замечание 12.1

Если $x \neq 0$, то длина вектора $\frac{x}{|x|}$ равна 1.

Доказательство. Используя (4), имеем

$$\left| \frac{x}{|x|} \right| = \left| \frac{1}{|x|} \cdot x \right| = \left| \frac{1}{|x|} \right| \cdot |x| = \frac{1}{|x|} \cdot |x| = 1,$$

что и требовалось доказать. □

Определение

Если $x \neq 0$, то вектор $\frac{x}{|x|}$ называется *ортом* вектора x .

12.2. Неравенство Коши–Буняковского и следствия из него

Теорема 12.1

Пусть V — пространство со скалярным произведением над полем F и $x, y \in V$.

1) Выполнено неравенство

$$|xy| \leq |x| \cdot |y|. \quad (5)$$

2) Равенство $|xy| = |x| \cdot |y|$ имеет место тогда и только тогда, когда векторы x и y линейно зависимы.

Неравенство (5) называется *неравенством Коши–Буняковского*.

Доказательство. 1) Из (3) вытекает, что если $y = 0$, то обе части неравенства (5) равны нулю и потому неравенство выполняется. Поэтому далее можно считать, что $y \neq 0$, и, в силу аксиомы 4), $yy > 0$. Рассмотрим вектор $x - \alpha y$, где $\alpha \in F$. По аксиоме 4) $(x - \alpha y)(x - \alpha y) \geq 0$. Раскрывая скобки и используя равенство (2), получаем неравенство

$$xx - \alpha yx - \bar{\alpha} xy + \alpha \bar{\alpha} yy \geq 0. \quad (6)$$

Неравенство Коши–Буняковского (2)

Подставим в (6) вместо α число $\frac{xy}{yy}$. Получим

$$\begin{aligned} 0 &\leq xx - \frac{xy}{yy} \cdot yx - \frac{\overline{xy}}{yy} \cdot xy + \frac{xy}{yy} \cdot \frac{\overline{xy}}{yy} \cdot yy = xx - \frac{xy \cdot yx}{yy} = \\ &= xx - \frac{xy \cdot \overline{xy}}{yy} = xx - \frac{|xy|^2}{yy}. \end{aligned}$$

Итак, $\frac{|xy|^2}{yy} \leq xx$. Домножая обе части этого неравенства на положительное число yy , имеем $|xy|^2 \leq xx \cdot yy$. Заменяя в последнем неравенстве xx на $|x|^2$ и yy на $|y|^2$ и извлекая квадратный корень из обеих частей неравенства, получаем (5).

2) Если векторы x и y линейно независимы, то $x - \alpha y \neq \mathbf{0}$ для всякого α и вместо неравенства (6) можно записать неравенство

$$xx - \alpha yx - \overline{\alpha} xy + \alpha \overline{\alpha} yy > 0.$$

После этого во всех последующих неравенствах можно заменить нестрогое неравенство на строгое и вместо (5) получить неравенство $|xy| < |x| \cdot |y|$. Таким образом, если в (5) имеет место равенство, то x и y линейно зависимы. Докажем обратное утверждение. Пусть x и y линейно зависимы, т. е. $\alpha x + \beta y = \mathbf{0}$ для некоторых чисел $\alpha, \beta \in F$, по крайней мере одно из которых не равно 0.

Без ограничения общности можно считать, что $\alpha \neq 0$. Тогда $\mathbf{x} = \gamma \mathbf{u}$, где $\gamma = -\frac{\beta}{\alpha}$. Используя (4), имеем

$$|\mathbf{x}\mathbf{u}| = |(\gamma \mathbf{u})\mathbf{u}| = |\gamma(\mathbf{u}\mathbf{u})| = |\gamma| \cdot |\mathbf{u}\mathbf{u}| = |\gamma| \cdot |\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{u}| = |\gamma\mathbf{u}| \cdot |\mathbf{u}| = |\mathbf{x}| \cdot |\mathbf{u}|.$$

Теорема доказана. □

Предположим, что пространство V евклидово. В этом случае, если $x, y \neq 0$, то неравенство Коши–Буняковского равносильно тому, что

$$-1 \leq \frac{xy}{|x| \cdot |y|} \leq 1.$$

Это делает корректным следующее определение.

Определение

Углом между ненулевыми векторами x и y евклидова пространства называется наименьший угол φ такой, что

$$\cos \varphi = \frac{xy}{|x| \cdot |y|}.$$

Угол между нулевым вектором и любым другим вектором не определен. Угол между векторами x и y обозначается через $(\widehat{x, y})$.

Отметим, что формула для вычисления косинуса угла между векторами в евклидовом пространстве полностью аналогична соответствующей формуле для векторов в обычном пространстве.

- В унитарном пространстве понятие угла между векторами не определено.

Из теоремы 12.1 вытекает

Следствие 12.1

- 1) Для произвольных векторов x и y из пространства со скалярным произведением выполнено неравенство

$$|x + y| \leq |x| + |y|. \quad (7)$$

- 2) Если векторы x и y линейно независимы, то $|x + y| < |x| + |y|$.

Доказательство этого утверждения приведено на следующем слайде.

Неравенство (7) называется *неравенством Минковского*. Оно обобщает известный факт из элементарной геометрии, называемый неравенством треугольника: сумма длин двух сторон треугольника больше длины третьей стороны. Поэтому неравенство (7) называют также *неравенством треугольника*.

Доказательство следствия 12.1. 1) Имеем:

$$\begin{aligned}
 |x + y|^2 &= (x + y)(x + y) \\
 &= |(x + y)(x + y)| && \text{так как } \mathbf{zz} \geq 0 \\
 &= |xx + xy + yx + yy| \\
 &\leq |xx| + |xy| + |yx| + |yy| && \text{так как } |a + b| \leq |a| + |b| \text{ для любых } a, b \in \mathbb{C} \\
 &= |xx| + |xy| + |\overline{xy}| + |yy| \\
 &= |xx| + 2|xy| + |yy| && \text{так как } |a| = |\overline{a}| \text{ для любого } a \in \mathbb{C} \\
 &= \mathbf{xx} + 2|xy| + \mathbf{yy} && \text{так как } \mathbf{zz} \geq 0 \\
 &\leq \mathbf{xx} + 2|x| \cdot |y| + \mathbf{yy} && \text{в силу (5)} \\
 &= |x|^2 + 2|x| \cdot |y| + |y|^2 && \text{поскольку } \mathbf{zz} = |z|^2 \\
 &= (|x| + |y|)^2.
 \end{aligned}$$

Мы видим, что $|x + y|^2 \leq (|x| + |y|)^2$. Извлекая из обеих частей этого неравенства квадратный корень, получаем неравенство (7).

2) Если векторы x и y линейно независимы, то, в силу теоремы 12.1, $|xy| < |x| \cdot |y|$. Заменяя в проведенных выше выкладках второе из нестрогих неравенств на строгое, получаем, что в этом случае $|x + y| < |x| + |y|$. □

Определение

Расстоянием между векторами x и y в пространстве со скалярным произведением называется длина вектора $x - y$. Оно обозначается через $\rho(x, y)$.

Отметим, что приведенное определение естественно. В самом деле, предположим, что мы рассматриваем обычное пространство с обычным скалярным произведением векторов. Представим себе, что все векторы откладываются от начала координат, и отождествим вектор с точкой, являющейся его концом. Тогда расстояние между двумя точками есть длина вектора, соединяющего их концы, т. е. длина разности векторов, соответствующих этим двум точкам (см. рис. 1).




Рис. 1. Расстояние между векторами

Свойства расстояния между векторами

Если x , y и z — произвольные векторы из пространства со скалярным произведением, то:

- 1) $\rho(x, x) = 0$;
- 2) $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
- 3) выполнено неравенство

$$\rho(x, y) + \rho(y, z) \geq \rho(x, z). \quad (8)$$

Доказательство. Свойства 1) и 2) очевидны. Докажем свойство 3).
Используя неравенство Минковского, имеем

$$\rho(x, z) = |x - z| = |(x - y) + (y - z)| \leq |x - y| + |y - z| = \rho(x, y) + \rho(y, z).$$

Замечание доказано. □

Неравенство (8) можно рассматривать как еще одно обобщение упоминавшегося выше неравенства треугольника из элементарной геометрии.

12.3. Вычисление скалярного произведения

Определение

Пусть V — пространство со скалярным произведением, а $A = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m\}$ — система векторов из V . *Матрицей Грама* системы векторов A называется квадратная матрица $G_A = (a_{ij})$ порядка m , определяемая правилом: $a_{ij} = \mathbf{a}_i \mathbf{a}_j$ для всех $i, j = 1, 2, \dots, m$.

Это понятие имеет многочисленные приложения, которым целиком будет посвящен один из следующих параграфов. Здесь мы приведем только одно из них. Для этого нам понадобится новое обозначение: для произвольной матрицы $B = (b_{ij})$ над полем \mathbb{C} мы полагаем $\overline{B} = (\overline{b_{ij}})$. Как показывает следующее утверждение, знание матрицы Грама системы базисных векторов в пространстве со скалярным произведением позволяет вычислить скалярное произведение любых двух векторов из этого пространства.

Предложение 12.2

Пусть V — пространство со скалярным произведением, C — базис в V , а $x, y \in V$. Тогда

$$xy = [x]_C^T \cdot G_C \cdot \overline{[y]_C}. \quad (9)$$

Вычисление скалярного произведения (2)

Уточним, что в формуле (9) мы отождествляем число x и квадратную матрицу 1-го порядка $[x]_C^T \cdot G_C \cdot \overline{[y]_C}$, единственным элементом которой является это число.

Доказательство. Положим $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$. Обозначим координаты векторов x и y в базисе C через (x_1, x_2, \dots, x_n) и (y_1, y_2, \dots, y_n) соответственно. Для того, чтобы вычислить произведение $[x]_C^T \cdot G_C \cdot \overline{[y]_C}$, найдем сначала произведение $[x]_C^T \cdot G_C$, а затем умножим эту матрицу на $\overline{[y]_C}$. Матрица $[x]_C^T \cdot G_C$ имеет размер $1 \times n$, т. е. является строкой длины n , i -й элемент которой (для всякого $i = 1, 2, \dots, n$) равен

$$x_1 c_1 c_i + x_2 c_2 c_i + \dots + x_n c_n c_i.$$

Произведение этой матрицы на матрицу $\overline{[y]_C}$ — это квадратная матрица 1-го порядка, т. е., по сути дела, число.

Вычисление скалярного произведения (3)

Вычислим это число, используя (2):

$$\begin{aligned} [\mathbf{x}]_C^T \cdot G_C \cdot \overline{[\mathbf{y}]_C} &= \sum_{i=1}^n (x_1 \mathbf{c}_1 \mathbf{c}_i + x_2 \mathbf{c}_2 \mathbf{c}_i + \cdots + x_n \mathbf{c}_n \mathbf{c}_i) \overline{y_i} = \\ &= \sum_{i=1}^n (x_1 \overline{y_i} \mathbf{c}_1 \mathbf{c}_i + x_2 \overline{y_i} \mathbf{c}_2 \mathbf{c}_i + \cdots + x_n \overline{y_i} \mathbf{c}_n \mathbf{c}_i) = \\ &= \sum_{i=1}^n ((x_1 \mathbf{c}_1)(y_i \mathbf{c}_i) + (x_2 \mathbf{c}_2)(y_i \mathbf{c}_i) + \cdots + (x_n \mathbf{c}_n)(y_i \mathbf{c}_i)) = \\ &= \sum_{i=1}^n (x_1 \mathbf{c}_1 + x_2 \mathbf{c}_2 + \cdots + x_n \mathbf{c}_n)(y_i \mathbf{c}_i) = \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbf{x}(y_i \mathbf{c}_i) = \mathbf{x} \cdot \sum_{i=1}^n y_i \mathbf{c}_i = \mathbf{x} \mathbf{y}. \end{aligned}$$

Предложение доказано. □