

Тема III. Линейные операторы

§ 3. Нормальные операторы

М.В.Волков

Уральский федеральный университет
Институт естественных наук и математики
кафедра алгебры и фундаментальной информатики

2020/2021 учебный год

Определение

Пусть F — одно из полей \mathbb{R} и \mathbb{C} , а V — векторное пространство над F . Отображение $V \times V \rightarrow F$, результат применения которого к паре векторов $x, y \in V$ обозначается xy , называется **скалярным произведением**, если:

- 1) $\forall x, y \in V \quad xy = \overline{yx}$;
- 2) $\forall x, y \in V \quad \forall \alpha \in F \quad (\alpha x)y = \alpha(xy)$;
- 3) $\forall x, y, z \in V \quad (x + y)z = xz + yz$ (**скалярное произведение дистрибутивно относительно сложения векторов**);
- 4) $\forall x \in V \quad xx \geqslant 0$, причем $xx = 0$ тогда и только тогда, когда $x = 0$.

Пространство со скалярным произведением над \mathbb{R} называется **евклидовым**; пространство со скалярным произведением над \mathbb{C} называется **унитарным**.

Определение

Длина вектора x — это неотрицательное действительное число $|x| := \sqrt{xx}$.

Пусть $\mathcal{A}: V_1 \rightarrow V_2$ – линейный оператор конечномерных пространств со скалярным произведением над полем $F \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

В прошлом семестре доказано, что для \mathcal{A} существует единственный **сопряженный оператор**, т.е. такой линейный оператор $\mathcal{A}^*: V_2 \rightarrow V_1$, что

$$\forall \mathbf{x} \in V_1 \quad \forall \mathbf{y} \in V_2 \quad \mathcal{A}\mathbf{x}\mathbf{y} = \mathbf{x}\mathcal{A}^*\mathbf{y}.$$

Основные свойства операции сопряжения:

$$\nabla 1: (\mathcal{A}^*)^* = \mathcal{A};$$

$$\nabla 2: (\alpha\mathcal{A})^* = \overline{\alpha}\mathcal{A}^*;$$

$$\nabla 3: (\mathcal{A} + \mathcal{B})^* = \mathcal{A}^* + \mathcal{B}^*;$$

$$\nabla 4: (\mathcal{A}\mathcal{B})^* = \mathcal{B}^*\mathcal{A}^*.$$

Предложение (матрица сопряженного оператора)

Если линейный оператор $\mathcal{A}: V_1 \rightarrow V_2$ имеет в ортонормированных базисах пространств V_1 и V_2 матрицу $A = (a_{ij})_{k \times n}$, то сопряженный оператор $\mathcal{A}^*: V_2 \rightarrow V_1$ имеет в тех же базисах **эрмитово сопряженную** матрицу $A^* := (\overline{a_{ji}})_{n \times k}$.

Определение

Пусть V – векторное пространство, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ – линейный оператор. Подпространство $S \subseteq V$ называется *инвариантным относительно \mathcal{A}* или *\mathcal{A} -инвариантным*, если $\mathcal{A}\mathbf{x} \in S$ для любого $\mathbf{x} \in S$.

- Примеры.*
- 1) Если \mathcal{A} – поворот обычного трехмерного пространства относительно оси Qz на какой-то угол θ , то плоскость Oxy и прямая Oz будут \mathcal{A} -инвариантными подпространствами.
 - 2) Если \mathbf{x} – собственный вектор оператора \mathcal{A} , одномерное подпространство, натянутое на \mathbf{x} , будет \mathcal{A} -инвариантным.
 - 3) Для любого линейного оператора \mathcal{A} его ядро $\text{Ker } \mathcal{A}$ и образ $\text{Im } \mathcal{A}$ будут \mathcal{A} -инвариантными подпространствами.

Пусть V – векторное пространство, $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ – линейный оператор, $S \subset V$ – ненулевое подпространство, инвариантное относительно \mathcal{A} .

Обозначим $n := \dim V$, $k := \dim S$; тогда $1 \leq k < n$. Выберем в S базис e_1, \dots, e_k и дополним его векторами e_{k+1}, \dots, e_n до базиса V .

Как выглядит матрица A оператора \mathcal{A} в базисе e_1, \dots, e_n ?

Поскольку подпространство S инвариантно, $\mathcal{A}e_i \in S$ при $i = 1, \dots, k$.

Поэтому при $i = 1, \dots, k$ в разложении вектора $\mathcal{A}e_i$ по базису e_1, \dots, e_n ненулевые коэффициенты могут быть только у векторов e_1, \dots, e_k .

Это означает, что матрица A будет *верхней полураспавшейся*:

$A = \begin{pmatrix} B & C \\ O & D \end{pmatrix}$; у нее будет $k \times k$ -блок B , отвечающий векторам e_1, \dots, e_k , под которым будет идти нулевая $(n - k) \times k$ -матрица O .

Матрица B есть не что иное как матрица *ограничения оператора \mathcal{A}* на подпространство S в базисе e_1, \dots, e_k .

Допустим теперь, что пространство V является *прямой суммой* ненулевых \mathcal{A} -инвариантных подпространств S_1, \dots, S_t .

Выберем в каждом S_i базис; объединение этих базисов есть базис V .

Как выглядит матрица A оператора \mathcal{A} в устроенном так базисе?

Определение

Квадратная матрица называется *блочно-диагональной*, если ее можно разбить на блоки A_{ij} так, что все блоки A_{ij} при $i \neq j$ нулевые матрицы, а все диагональные блоки A_{ii} – квадратные матрицы:

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{tt} \end{pmatrix}.$$

Понятно, что матрица A будет блочно-диагональной, причем i -й диагональный блок будет матрицей ограничения оператора \mathcal{A} на подпространство S_i в выбранном в этом подпространстве базисе.

Пусть V – пространство со скалярным произведением, а S – подпространство в V . Множество S^\perp всех векторов, ортогональных к произвольному вектору из S , называется *ортогональным дополнением* подпространства S . Ортогональное дополнение подпространства само является подпространством и $V = S \oplus S^\perp$.

Лемма 1

Если V – пространство со скалярным произведением, а S – его подпространство, инвариантное относительно линейного оператора $\mathcal{A}: V \rightarrow V$, то подпространство S^\perp инвариантно относительно сопряженного оператора $\mathcal{A}^: V \rightarrow V$.*

Доказательство. Возьмем произвольные вектора $x \in S$ и $y \in S^\perp$. Имеем

$$\begin{aligned} x\mathcal{A}^*y &= \mathcal{A}xy && \text{свойство сопряженного оператора} \\ &= 0 && \text{так как } \mathcal{A}x \in S, \text{ а } y \in S^\perp. \end{aligned}$$

Итак, вектор \mathcal{A}^*y ортогонален произвольному вектору $x \in S$, откуда $\mathcal{A}^*y \in S^\perp$. □

Определение

Линейный оператор $\mathcal{A}: V \rightarrow V$ называется **нормальным**, если он перестановчен со своим сопряженным, т.е. если $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$.

Примерами нормальных операторов служат **самосопряженные** операторы (когда $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}$) и **унитарные/ортогональные** операторы (когда $\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^{-1}$). Эти типы нормальных операторов будут рассмотрены позднее, а сейчас займемся произвольными нормальными операторами.

Лемма 2

Пусть x – собственный вектор нормального оператора \mathcal{A} , принадлежащий собственному значению λ . Тогда x является собственным вектором сопряженного оператора \mathcal{A}^* , принадлежащим собственному значению $\bar{\lambda}$.

Доказательство. Положим $\mathcal{B} := \mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}$, где \mathcal{E} – тождественный оператор. Тогда $\mathcal{B}^* = \mathcal{A}^* - \bar{\lambda}\mathcal{E}$ и из $\mathcal{A}\mathcal{A}^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$ следует, что

$$\mathcal{B}\mathcal{B}^* = (\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})(\mathcal{A}^* - \bar{\lambda}\mathcal{E}) = (\mathcal{A}^* - \bar{\lambda}\mathcal{E})(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E}) = \mathcal{B}^*\mathcal{B}.$$

Хотим доказать, что $\mathcal{A}^*x = \bar{\lambda}x$, т.е. что $(\mathcal{A}^* - \bar{\lambda}\mathcal{E})x = \mathcal{B}^*x = 0$.

Для этого достаточно убедиться, что $\mathcal{B}^*x\mathcal{B}^*x = 0$.

Нормальный оператор (2)

Имеем

$$\begin{aligned}\mathcal{B}^* \mathbf{x} \mathcal{B}^* \mathbf{x} &= \mathbf{x} \mathcal{B} \mathcal{B}^* \mathbf{x} && \text{свойство сопряженного оператора} \\ &= \mathbf{x} \mathcal{B}^* \mathcal{B} \mathbf{x} && \text{так как } \mathcal{B} \mathcal{B}^* = \mathcal{B}^* \mathcal{B} \\ &= \mathcal{B} \mathbf{x} \mathcal{B} \mathbf{x} && \text{свойство сопряженного оператора} \\ &= 0 && \text{так как } \mathcal{B} \mathbf{x} = (\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E}) \mathbf{x} = \mathbf{0}. \quad \square\end{aligned}$$

В прошлой лекции доказано, что собственные векторы, принадлежащие попарно различным собственным значениям, линейно независимы.

Для нормальных операторов верно более сильное свойство:

Следствие

Собственные векторы нормального оператора, принадлежащие различным собственным значениям, ортогональны.

Доказательство. Пусть \mathbf{x} и \mathbf{y} – собственные векторы нормального оператора \mathcal{A} , принадлежащие соответственно λ и μ . Имеем

$$\lambda \mathbf{x} \mathbf{y} = \mathcal{A} \mathbf{x} \mathbf{y} = \mathbf{x} \mathcal{A}^* \mathbf{y} = \mathbf{x} \bar{\mu} \mathbf{y} = \mu \mathbf{x} \mathbf{y} \quad \text{т.е. } (\lambda - \mu) \mathbf{x} \mathbf{y} = 0.$$

При $\lambda \neq \mu$ отсюда следует $\mathbf{x} \mathbf{y} = 0$. \square

Теорема 1

Линейный оператор \mathcal{A} на унитарном пространстве V нормален тогда и только тогда, когда в V существует ортонормированный базис из собственных векторов \mathcal{A} .

Доказательство. *Необходимость.* Индукция по $\dim V$ с очевидной базой.

При $\dim V > 1$ возьмем собственный вектор x оператора \mathcal{A} . Его орт e_1 также будет собственным вектором для \mathcal{A} , а по лемме 2 e_1 будет собственным вектором и для сопряженного оператора \mathcal{A}^* .

Подпространство S , натянутое на e_1 , инвариантно относительно \mathcal{A} и \mathcal{A}^* .

По лемме 1 ортогональное дополнение S^\perp также инвариантно относительно \mathcal{A} и \mathcal{A}^* . Понятно, что ограничения операторов \mathcal{A} и \mathcal{A}^* на S^\perp перестановочны между собой, в силу чего ограничение \mathcal{A} на S^\perp – нормальный оператор. Поскольку $\dim S^\perp = \dim V - \dim S < \dim V$, по предположению индукции в S^\perp существует ортонормированный базис $e_2, \dots, e_{\dim V}$ из собственных векторов ограничения \mathcal{A} на S^\perp .


Добавив к нему вектор e_1 , получим ортонормированный базис всего пространства V , состоящий из собственных векторов оператора \mathcal{A} .

Достаточность. Матрица A оператора \mathcal{A} в базисе из собственных векторов этого оператора диагональна. Раз базис ортонормированный, то в этом базисе матрица сопряженного оператора \mathcal{A}^* равна эрмитово сопряженной к A матрице $A^* = A^T$ и, следовательно, тоже диагональна. Поэтому $AA^* = A^*A$, так как диагональные матрицы перестановочные. Отсюда $AA^* = \mathcal{A}^*\mathcal{A}$, т.е. \mathcal{A} – нормальный оператор. □

Для нормального оператора евклидова пространства аналог теоремы 1 неверен, поскольку такой оператор может не иметь собственных векторов.

Примером может служить оператор $\mathcal{R}_{\frac{\pi}{2}}$ поворота плоскости на угол $\frac{\pi}{2}$,

матрица которого равна $R := \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.



Ее эрмитово сопряженная матрица есть попросту $R^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ и легко подсчитать, что $RR^T = R^TR = E$. Поэтому оператор $\mathcal{R}_{\frac{\pi}{2}}$ нормален, но собственных векторов у $\mathcal{R}_{\frac{\pi}{2}}$ нет.

Несмотря на указанную трудность, структуру нормального оператора на евклидовом пространстве удается полностью прояснить.

Теорема 2

Линейный оператор \mathcal{A} на евклидовом пространстве V нормален тогда и только тогда, когда в V существует ортонормированный базис, в котором матрица оператора \mathcal{A} блоchно-диагональна с диагональными блоками либо размера 1, либо размера 2 и вида $\rho \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$.

Вот «развернутый» вид матрицы из формулировки теоремы 2:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & & & & \\ \alpha_2 & & & & \\ \dots & & & & \\ \alpha_k & & & & \\ & \rho_1 \begin{pmatrix} \cos \varphi_1 & \sin \varphi_1 \\ -\sin \varphi_1 & \cos \varphi_1 \end{pmatrix} & & & \\ & & \rho_2 \begin{pmatrix} \cos \varphi_2 & \sin \varphi_2 \\ -\sin \varphi_2 & \cos \varphi_2 \end{pmatrix} & & \\ & & & \dots & \\ & & & & \rho_m \begin{pmatrix} \cos \varphi_m & \sin \varphi_m \\ -\sin \varphi_m & \cos \varphi_m \end{pmatrix} \end{pmatrix}.$$

Необходимость. Индукция по $\dim V$ с очевидной базой.

Пусть $\dim V > 1$. Рассмотрим два случая.

Случай 1.

У оператора \mathcal{A} есть действительное собственное значение.

В этом случае проходят рассуждения из доказательства теоремы 1.

Возьмем собственный вектор x оператора \mathcal{A} . Его орт e_1 также будет собственным вектором для \mathcal{A} , а по лемме 2 e_1 будет собственным вектором и для сопряженного оператора \mathcal{A}^* . Подпространство S , натянутое на e_1 , инвариантно относительно \mathcal{A} и \mathcal{A}^* . По лемме 1 ортогональное дополнение S^\perp также инвариантно относительно \mathcal{A} и \mathcal{A}^* . Понятно, что ограничения операторов \mathcal{A} и \mathcal{A}^* на S^\perp перестановочны между собой, в силу чего ограничение \mathcal{A} на S^\perp – нормальный оператор. Поскольку $\dim S^\perp = \dim V - \dim S < \dim V$, по предположению индукции в S^\perp существует ортонормированный базис $e_2, \dots, e_{\dim V}$, в котором матрица A' ограничения \mathcal{A} на S^\perp имеет указанный в теореме блочно-диагональный вид. Добавив к нему вектор e_1 , получим ортонормированный базис всего пространства V . Матрица оператора \mathcal{A} в этом базисе получается из A' добавлением одного блока размера 1.

Случай 2.

У оператора \mathcal{A} нет действительных собственных значений.

В этом случае характеристический многочлен оператора \mathcal{A} разлагается в произведение квадратных трехчленов с отрицательным дискриминантом. Возьмём один из них и пусть $\alpha = \sigma + \tau i$ и $\bar{\alpha} = \sigma - \tau i$ – его корни.

Зафиксируем некоторый ортонормированный базис пространства V и запишем в нём матрицу A оператора \mathcal{A} . Возьмем теперь унитарное пространство U размерности $\dim V$, зафиксируем в нём некоторый ортонормированный базис и определим на U линейный оператор $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ с матрицей A ([комплексификация](#) \mathcal{A}). Так как A – действительная матрица, $A^* = A^T$, а так как \mathcal{A} – нормальный оператор, $AA^T = A^TA$. Заключаем, что и $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ – нормальный оператор. Отметим еще, что отождествляя зафиксированные базисы в V и U , можно считать, что $V \subset U$. При таком отождествлении \mathcal{A} и $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ действуют на V одинаково. Характеристические многочлены операторов \mathcal{A} и $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ совпадают, так что α и $\bar{\alpha}$ – собственные значения оператора $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$. Если x – собственный вектор оператора $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$, принадлежащий α , то $A[x] = \alpha[x]$. Сопрягая это равенство, с учетом того, что A – действительная матрица, получаем $A[\bar{x}] = \bar{\alpha}[\bar{x}]$. Видим, что \bar{x} – собственный вектор оператора $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$, принадлежащий $\bar{\alpha}$.

Доказательство теоремы 2: Необходимость, случай 2 (2)

Запишем $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{b}i$, где $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$. Тогда $\overline{\mathbf{x}} = \mathbf{a} - \mathbf{b}i$. Выразив отсюда вектора \mathbf{a} и \mathbf{b} , получим: $\mathbf{a} = \frac{\mathbf{x} + \overline{\mathbf{x}}}{2}$ и $\mathbf{b} = \frac{\mathbf{x} - \overline{\mathbf{x}}}{2i}$. Учитывая, что \mathcal{A} и $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$ действуют на V одинаково и $\alpha = \sigma + \tau i$ и $\overline{\alpha} = \sigma - \tau i$, имеем

$$\begin{aligned}\mathcal{A}\mathbf{a} &= \mathcal{A}_{\mathbb{C}}\mathbf{a} = \frac{1}{2}(\mathcal{A}_{\mathbb{C}}\mathbf{x} + \mathcal{A}_{\mathbb{C}}\overline{\mathbf{x}}) = \frac{1}{2}(\alpha\mathbf{x} + \overline{\alpha}\overline{\mathbf{x}}) = \\ &= \frac{1}{2}((\sigma + \tau i)\mathbf{x} + (\sigma - \tau i)\overline{\mathbf{x}}) = \frac{1}{2}\sigma(\mathbf{x} + \overline{\mathbf{x}}) + \frac{1}{2}\tau i(\mathbf{x} - \overline{\mathbf{x}}) = \sigma\mathbf{a} - \tau\mathbf{b}.\end{aligned}$$

Аналогично,

$$\begin{aligned}\mathcal{A}\mathbf{b} &= \mathcal{A}_{\mathbb{C}}\mathbf{b} = \frac{1}{2i}(\mathcal{A}_{\mathbb{C}}\mathbf{x} - \mathcal{A}_{\mathbb{C}}\overline{\mathbf{x}}) = \frac{1}{2i}(\alpha\mathbf{x} - \overline{\alpha}\overline{\mathbf{x}}) = \\ &= \frac{1}{2i}((\sigma + \tau i)\mathbf{x} - (\sigma - \tau i)\overline{\mathbf{x}}) = \frac{1}{2i}\sigma(\mathbf{x} - \overline{\mathbf{x}}) + \frac{1}{2}\tau(\mathbf{x} + \overline{\mathbf{x}}) = \tau\mathbf{a} + \sigma\mathbf{b}.\end{aligned}$$

Итак, подпространство S в V , натянутое на вектора \mathbf{a} и \mathbf{b} , инвариантно относительно оператора \mathcal{A} . Из леммы 2 вытекает, что вектора \mathbf{x} и $\overline{\mathbf{x}}$ – собственные для оператора $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}^*$ и принадлежат собственным значениям $\overline{\alpha}$ и α соответственно. Пользуясь этим легко проверить, что подпространство S инвариантно и относительно оператора \mathcal{A}^* .

По лемме 1 ортогональное дополнение S^\perp также инвариантно относительно \mathcal{A} и \mathcal{A}^* . Понятно, что ограничения операторов \mathcal{A} и \mathcal{A}^* на S^\perp перестановочны между собой, в силу чего ограничение \mathcal{A} на S^\perp – нормальный оператор. Поскольку $\dim S^\perp = \dim V - \dim S < \dim V$, по предположению индукции в S^\perp существует ортонормированный базис $e_3, \dots, e_{\dim V}$, в котором матрица ограничения \mathcal{A} на S^\perp имеет указанный в теореме блочно-диагональный вид. Остается построить «правильный» ортонормированный базис в подпространстве S .

По следствию леммы 2 вектора x и \bar{x} ортогональны как собственные векторы нормального оператора $\mathcal{A}_{\mathbb{C}}$, принадлежащие его различным собственным значениям α и $\bar{\alpha}$. Отсюда

$$\begin{aligned} 0 = x\bar{x} &= (\mathbf{a} + \mathbf{b}i)(\mathbf{a} - \mathbf{b}i) = \mathbf{aa} - \mathbf{a}(\mathbf{b}i) + (\mathbf{b}i)\mathbf{a} - (\mathbf{b}i)(\mathbf{b}i) = \\ &= \mathbf{aa} + i\mathbf{ab} + i\mathbf{ba} - \mathbf{bb} = |\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 + 2i\mathbf{ab}. \end{aligned}$$

Заключаем, что $|\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 = 0$ и $\mathbf{ab} = 0$, т.е. $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$ и $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$. Поэтому орты $e_1 = \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$ и $e_2 = \frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{a}|}$ образуют ортонормированный базис в S .

Доказательство теоремы 2: Достаточность

Выше подсчитано, что $\mathcal{A}\mathbf{a} = \sigma\mathbf{a} - \tau\mathbf{b}$, а $\mathcal{A}\mathbf{b} = \tau\mathbf{a} + \sigma\mathbf{b}$. Разделив эти равенства на $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$, получим действие оператора \mathcal{A} на базис $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$:

$$\begin{cases} \mathcal{A}\mathbf{e}_1 = \sigma\mathbf{e}_1 - \tau\mathbf{e}_2, \\ \mathcal{A}\mathbf{e}_2 = \tau\mathbf{e}_1 + \sigma\mathbf{e}_2. \end{cases} \quad \text{Итак, матрица ограничения оператора } \mathcal{A}$$

на подпространство S в базисе $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ равна $\begin{pmatrix} \sigma & \tau \\ -\tau & \sigma \end{pmatrix}$. Если записать комплексное число $\alpha = \sigma + \tau i$ в тригонометрической форме

$\alpha = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, то эта матрица запишется как $\rho \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$,

т.е. в точности в том виде, который указан в формулировке теоремы 2.

Итак, добавив к базису $\mathbf{e}_3, \dots, \mathbf{e}_{\dim V}$ подпространства S^\perp вектора \mathbf{e}_1 и \mathbf{e}_2 , получим ортонормированный базис всего пространства V , в котором матрица оператора \mathcal{A} имеет требуемый вид.

Достаточность. Для действительных матриц эрмитово сопряжение сводится к транспонированию. Легко проверяется, что каждый блок блоchно-диагональной матрицы из формулировки теоремы 2 перестановчен со своей транспонированной матрицей (проверьте!). □

Теорема о строении нормального оператора на евклидовом пространстве – еще один пример «100% действительного» факта, для **формулировки** которого комплексные числа не нужны, но **доказательство** которого использует комплексные числа.

Сравнение формулировок и особенно доказательств теорем 1 и 2 еще раз показывает, насколько комплексные числа лучше действительных!

