

# § 42. Прямолинейные образующие квадрик в пространстве

Б.М.Верников

Уральский федеральный университет,  
Институт естественных наук и математики,  
кафедра алгебры и фундаментальной информатики

## 42.1. Квадрики, содержащие и не содержащие прямолинейные образующие

### Определение

Прямая, целиком лежащая на поверхности, называется *прямолинейной образующей* этой поверхности.

Прямолинейные образующие по определению имеют цилиндрические и конические поверхности, в частности, эллиптический, гиперболический и параболический цилиндры и конус. Из построения этих поверхностей вытекает, что на каждой из них через произвольную точку проходит ровно одна прямолинейная образующая, причем на цилиндрических поверхностях любые две прямолинейные образующие параллельны, а на конических поверхностях все они попарно пересекаются (в вершине поверхности). Замечания 40.1 и 40.2 показывают, что прямолинейные образующие есть у однополостного гиперboloида и гиперболического параболоида. Как будет показано на следующем слайде, все остальные «невырожденные» квадрики в пространстве прямолинейных образующих не имеют.

# Отсутствие прямолинейных образующих у эллипсоида, двуполостного гиперboloида и эллиптического параболоида (1)

## Замечание 42.1

*Эллипсоид, двуполостный гиперboloид и эллиптический параболоид не имеют прямолинейных образующих.*

**Доказательство.** Будем считать, что эти поверхности заданы своими каноническими уравнениями. Эллипсоид не имеет прямолинейных образующих, потому что он целиком расположен внутри параллелепипеда, задаваемого неравенствами  $|x| \leq a$ ,  $|y| \leq b$  и  $|z| \leq c$ .

Перейдем к двуполостному гиперboloиду. Если прямая параллельна плоскости  $Oxy$ , то она лежит в плоскости, задаваемой уравнением  $z = h$  для некоторого  $h$ . Но, как мы видели в § 40, сечение двуполостного гиперboloида плоскостью вида  $z = h$  является либо эллипсом, либо точкой, либо пустым множеством. В любом случае это сечение не содержит никакой прямой. Если же прямая либо пересекает плоскость  $Oxy$ , либо лежит в ней, то она не может лежать на нашем гиперboloиде, так как он не пересекает указанную плоскость. Отметим, что вместо  $Oxy$  здесь можно рассматривать любую плоскость, заданную уравнением  $z = r$ , где  $|r| < c$ .

## Отсутствие прямолинейных образующих у эллипсоида, двуполостного гиперboloида и эллиптического параболоида (2)

Аналогично проверяется отсутствие прямолинейных образующих у эллиптического параболоида (надо только вместо плоскости  $Oxy$  рассмотреть плоскость, заданную уравнением  $z = r$ , где  $r$  — произвольное отрицательное число). □

# Число прямолинейных образующих однополостного гиперboloида, проходящих через данную точку (1)

Основная цель этого параграфа — указать некоторые свойства и способ нахождения уравнений прямолинейных образующих однополостного гиперboloида и гиперболического параболоида.

## 42.2. Прямолинейные образующие однополостного гиперboloида

### Теорема 42.1

*Через каждую точку однополостного гиперboloида проходит ровно две прямолинейных образующих.*

**Доказательство.** Напомним, что однополостный гиперboloид задается в подходящей системе координат уравнением вида

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1. \quad (1)$$

Пусть точка  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  принадлежит однополостному гиперboloиду, заданному уравнением (1), а прямая  $\ell$ , проходящая через эту точку, является прямолинейной образующей этого гиперboloида.

## Число прямолинейных образующих однополостного гиперboloида, проходящих через данную точку (2)

Запишем параметрические уравнения прямой  $\ell$ :

$$\begin{cases} x = x_0 + pt, \\ y = y_0 + qt, \\ z = z_0 + rt. \end{cases} \quad (2)$$

Положим

$$\begin{aligned} X &= \frac{x}{a}, \quad Y = \frac{y}{b}, \quad Z = \frac{z}{c}, \quad X_0 = \frac{x_0}{a}, \quad Y_0 = \frac{y_0}{b}, \quad Z_0 = \frac{z_0}{c}, \\ P &= \frac{p}{a}, \quad Q = \frac{q}{b}, \quad R = \frac{r}{c}. \end{aligned} \quad (3)$$

В этих обозначениях уравнение гиперboloида принимает вид

$$X^2 + Y^2 - Z^2 = 1, \quad (4)$$

а уравнения прямой  $\ell$  — вид

$$\begin{cases} X = X_0 + Pt, \\ Y = Y_0 + Qt, \\ Z = Z_0 + Rt. \end{cases} \quad (5)$$

Напомним, что вектор  $\vec{a} = (p, q, r)$  является направляющим вектором прямой  $\ell$ . Если  $r \neq 0$ , то  $R$  также отлично от 0, и разделив вектор  $\vec{a}$  на  $R$ , мы получим направляющий вектор прямой  $\ell$ , третья координата которого равна  $c$ .

## Число прямолинейных образующих однополостного гиперboloида, проходящих через данную точку (3)

Поскольку нам не важно, координаты какого именно из направляющих векторов прямой  $\ell$  стоят в правых частях уравнений (2), в дальнейшем можно считать, что либо  $r = 0$ , либо  $r = c$ , т.е. либо  $R = 0$ , либо  $R = 1$ . Подставим правые части уравнений (5) в уравнение (4). Получим

$$(X_0 + Pt)^2 + (Y_0 + Qt)^2 - (Z_0 + Rt)^2 = 1. \quad (6)$$

С другой стороны,

$$X_0^2 + Y_0^2 - Z_0^2 = 1, \quad (7)$$

поскольку точка  $M_0$  лежит на гиперboloиде. Вычтем равенство (7) из равенства (6). После очевидных преобразований, получим

$$(P^2 + Q^2 - R^2)t^2 + 2(X_0P + Y_0Q - Z_0R)t = 0.$$

Поскольку все точки прямой  $\ell$  лежат на гиперboloиде, последнее равенство должно выполняться для любого  $t$ . Это возможно лишь в случае, когда выполнены равенства

$$\begin{cases} P^2 + Q^2 - R^2 = 0, \\ X_0P + Y_0Q - Z_0R = 0. \end{cases}$$

Первое из этих равенств показывает, что если  $R = 0$ , то  $P = Q = 0$ , и потому  $p = q = r = 0$ . Но это невозможно, поскольку вектор  $\vec{a}$ , будучи направляющим вектором прямой, не может быть нулевым.

## Число прямолинейных образующих однополостного гиперboloида, проходящих через данную точку (4)

В силу сказанного выше, можно считать, что  $R = 1$ . Следовательно,

$$\begin{cases} P^2 + Q^2 = 1, \\ X_0 P + Y_0 Q = Z_0. \end{cases} \quad (8)$$

Из уравнения (7) видно, что случай, когда  $X_0 = Y_0 = 0$ , невозможен. Следовательно, либо  $X_0 \neq 0$ , либо  $Y_0 \neq 0$ . Будем далее считать, что  $Y_0 \neq 0$  (случай, когда  $X_0 \neq 0$ , разбирается вполне аналогично и приводит к тем же самым результатам). Из второго из уравнений (8) имеем  $Q = \frac{Z_0 - X_0 P}{Y_0}$ . Подставив правую часть последнего равенства вместо  $Q$  в первое из уравнений (8), мы после очевидных преобразований получим следующее квадратное уравнение относительно  $P$ :

$$\left(1 + \frac{X_0^2}{Y_0^2}\right)P^2 - \frac{2X_0 Z_0}{Y_0^2} \cdot P + \frac{Z_0^2}{Y_0^2} - 1 = 0.$$

Умножив обе части уравнения на  $Y_0^2$ , получим:

$$(X_0^2 + Y_0^2)P^2 - 2X_0 Z_0 P + Z_0^2 - Y_0^2 = 0. \quad (9)$$

Подсчитаем дискриминант квадратного трехчлена, стоящего в левой части этого уравнения.

## Число прямолинейных образующих однополостного гиперboloида, проходящих через данную точку (5)

Используя равенство (7), получим:

$$\begin{aligned} D &= 4X_0^2 Z_0^2 - 4(X_0^2 + Y_0^2)(Z_0^2 - Y_0^2) = \\ &= 4(X_0^2 Z_0^2 - X_0^2 Z_0^2 + X_0^2 Y_0^2 - Y_0^2 Z_0^2 + Y_0^4) = \\ &= 4(X_0^2 + Y_0^2 - Z_0^2)Y_0^2 = \\ &= 4Y_0^2 > 0. \end{aligned}$$

Следовательно, уравнение (9) имеет два различных решения. Это означает, что направляющий вектор прямой  $\ell$  можно выбрать двумя способами, т. е. через точку  $M_0$  проходит ровно две прямолинейных образующих нашего гиперboloида. □

# Параметрические уравнения прямолинейных образующих однополостного гиперболоида (1)

Продолжим рассуждения, начатые в доказательстве теоремы 42.1, для того, чтобы вывести уравнения этих прямолинейных образующих. Решим уравнение (9), используя формулу для корней квадратного уравнения с четным коэффициентом при первой степени неизвестного:

$$P = \frac{X_0 Z_0 \pm Y_0}{X_0^2 + Y_0^2}.$$

Отсюда

$$\begin{aligned} Q &= \frac{Z_0 - X_0 P}{Y_0} = \frac{Z_0 - \frac{(X_0 Z_0 \pm Y_0) X_0}{X_0^2 + Y_0^2}}{Y_0} = \\ &= \frac{X_0^2 Z_0 + Y_0^2 Z_0 - X_0^2 Z_0 \mp X_0 Y_0}{Y_0 (X_0^2 + Y_0^2)} = \\ &= \frac{Y_0 Z_0 \mp X_0}{X_0^2 + Y_0^2}. \end{aligned}$$

Напомним, что  $R = 1$ .

## Параметрические уравнения прямолинейных образующих однополостного гиперболоида (2)

Используя формулы (3), получаем, что параметрические уравнения прямой  $\ell$  имеют вид

$$\begin{cases} x = x_0 + \frac{\frac{x_0 z_0}{ac} + \varepsilon \cdot \frac{y_0}{b}}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}} \cdot at, \\ y = y_0 + \frac{\frac{y_0 z_0}{bc} - \varepsilon \cdot \frac{x_0}{a}}{\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}} \cdot bt, \\ z = z_0 + ct, \end{cases} \quad (10)$$

где  $\varepsilon \in \{1, -1\}$ . Для того, чтобы упростить эти уравнения, нам понадобится одно новое понятие.

### Определение

Эллипс, получающийся при сечении однополостного гиперболоида, заданного уравнением (1), плоскостью  $Oxy$ , называется **горловым эллипсом** этого гиперболоида (см. рисунок на следующем слайде).




Рис. 1. Горловой эллипс

## Параметрические уравнения прямолинейных образующих однополостного гиперболоида (3)

Если в уравнениях (10) положить  $t = -\frac{z_0}{c}$ , то мы получим  $z = 0$ . Таким образом, точка прямой  $\ell$ , соответствующая указанному значению параметра  $t$ , лежит в плоскости  $Oxy$ . Поскольку прямая  $\ell$  лежит на гиперболоиде, эта точка принадлежит горловому эллипсу. Мы видим, что справедливо следующее

### Замечание 42.2

*Всякая прямолинейная образующая однополостного гиперболоида пересекает его горловой эллипс.*



Возьмем точку прямой  $\ell$ , принадлежащую горловому эллипсу, в качестве точки  $M_0$ . Тогда  $z_0 = 0$ . Поскольку точка  $M_0$  принадлежит гиперболоиду, отсюда вытекает, что

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1. \quad (11)$$

## Два семейства прямолинейных образующих однополостного гиперболоида

Учитывая уравнения (10), мы получаем, что уравнения прямолинейных образующих, проходящих через точку  $M_0$ , имеют вид

$$\begin{cases} x = x_0 + \frac{ay_0}{b}t, \\ y = y_0 - \frac{bx_0}{a}t, \\ z = ct \end{cases} \quad (12)$$

и

$$\begin{cases} x = x_0 - \frac{ay_0}{b}t, \\ y = y_0 + \frac{bx_0}{a}t, \\ z = ct. \end{cases} \quad (13)$$

Поскольку горловой эллипс содержит бесконечно много точек, уравнения вида (12) и (13) задают два бесконечных семейства прямолинейных образующих однополостного гиперболоида. Из доказательства теоремы 42.1 вытекает

### Замечание 42.3

*Через каждую точку однополостного гиперболоида проходит по одной прямолинейной образующей из каждого семейства.*



# Взаимное расположение прямолинейных образующих однополостного гиперboloида (1)

Две точки, лежащие на эллипсе, называются *диаметрально противоположными*, если прямая, их соединяющая, проходит через центр эллипса.

## Теорема 42.2

*Любые две прямолинейные образующие однополостного гиперboloида из одного семейства скрещиваются. Две прямолинейные образующие из разных семейств параллельны, если они проходят через диаметрально противоположные точки горлового эллипса, и пересекаются в противном случае.*

**Доказательство.** Пусть  $\ell_1$  и  $\ell_2$  — различные прямолинейные образующие из одного семейства, проходящие через точки горлового эллипса  $M_1(x_1, y_1, 0)$  и  $M_2(x_2, y_2, 0)$  соответственно. Для определенности будем считать, что прямые  $\ell_1$  и  $\ell_2$  принадлежат семейству, задаваемому уравнениями вида (12) (для семейства, задаваемого уравнениями вида (13) доказательство аналогично). Направляющим вектором прямой  $\ell_1$  является вектор  $\vec{s}_1 = (\frac{ay_1}{b}, -\frac{bx_1}{a}, c)$ , а направляющим вектором прямой  $\ell_2$  — вектор  $\vec{s}_2 = (\frac{ay_2}{b}, -\frac{bx_2}{a}, c)$ . Поскольку точки  $M_1$  и  $M_2$  различны, по крайней мере одно из чисел  $x_2 - x_1$  и  $y_2 - y_1$  отлично от нуля.

## Взаимное расположение прямолинейных образующих однополостного гиперboloида (2)

Поскольку точки  $M_1$  и  $M_2$  различны, по крайней мере одно из чисел  $x_2 - x_1$  и  $y_2 - y_1$  отлично от нуля. С учетом этого, имеем

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & 0 \\ \frac{ay_1}{b} & -\frac{bx_1}{a} & c \\ \frac{ay_2}{b} & -\frac{bx_2}{a} & c \end{vmatrix} = (x_2 - x_1) \left( -\frac{bcx_1}{a} + \frac{bcx_2}{a} \right) - (y_2 - y_1) \left( \frac{acy_1}{b} - \frac{acy_2}{b} \right) = \\ = \frac{bc}{a} (x_2 - x_1)^2 + \frac{ac}{b} (y_2 - y_1)^2 \neq 0.$$

В силу теоремы 14.3 это означает, что прямые  $\ell_1$  и  $\ell_2$  скрещиваются.

Пусть теперь  $\ell_1$  и  $\ell_2$  — прямолинейные образующие из разных семейств, проходящие через лежащие на горловом эллипсе точки  $M_1(x_1, y_1, 0)$  и  $M_2(x_2, y_2, 0)$  соответственно. С учетом (12) и (13), их уравнения можно записать так:

$$\ell_1 : \frac{x - x_1}{ay_1/b} = \frac{y - y_1}{-bx_1/a} = \frac{z}{c}, \quad \ell_2 : \frac{x - x_2}{-ay_2/b} = \frac{y - y_2}{bx_2/a} = \frac{z}{c}.$$

Учитывая, что точки  $M_1$  и  $M_2$  лежат на гиперboloиде, получаем, что  $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1$ .

## Взаимное расположение прямолинейных образующих однополостного гиперболоида (3)

Следовательно,

$$\begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & 0 \\ \frac{ay_1}{b} & -\frac{bx_1}{a} & c \\ -\frac{ay_2}{b} & \frac{bx_2}{a} & c \end{vmatrix} = (x_2 - x_1) \left( -\frac{bcx_1}{a} - \frac{bcx_2}{a} \right) - (y_2 - y_1) \left( \frac{acy_1}{b} + \frac{acy_2}{b} \right) =$$
$$= \frac{bc}{a}(x_1^2 - x_2^2) + \frac{ac}{b}(y_1^2 - y_2^2) =$$
$$= abc \left( \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} \right) - abc \left( \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} \right) = abc - abc = 0.$$

В силу теоремы 14.3 это означает, что прямые  $\ell_1$  и  $\ell_2$  лежат в одной плоскости. Ясно, что они параллельны, если их направляющие векторы пропорциональны, и пересекаются в противном случае. Направляющими векторами прямых  $\ell_1$  и  $\ell_2$  являются векторы  $\vec{s}_1 = \left( \frac{ay_1}{b}, -\frac{bx_1}{a}, c \right)$  и  $\vec{s}_2 = \left( \frac{-ay_2}{b}, \frac{bx_2}{a}, c \right)$  соответственно. Следовательно, эти векторы пропорциональны тогда и только тогда, когда  $-\frac{y_1}{y_2} = -\frac{x_1}{x_2} = 1$ , т.е. когда  $x_2 = -x_1$  и  $y_2 = -y_1$ . Поскольку прямые  $\ell_1$  и  $\ell_2$  пересекают горловой эллипс в точках  $M_1(x_1, y_1, 0)$  и  $M_2(x_2, y_2, 0)$  соответственно, получаем, что  $\ell_1$  и  $\ell_2$  параллельны, если точки  $M_1$  и  $M_2$  диаметрально противоположны, и пересекаются в противном случае.

# Общие уравнения прямолинейных образующих однополостного гиперболоида (1)

Выше мы получили параметрические уравнения прямолинейных образующих однополостного гиперболоида. Но для того, чтобы их написать, надо знать координаты хотя бы одной точки, лежащей на этой поверхности. Покажем, как можно найти общие уравнения прямолинейных образующих однополостного гиперболоида, не имея этой информации, а зная только уравнение гиперболоида.

Уравнение (1) можно переписать в виде  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2}$  или

$$\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) \cdot \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = \left(1 - \frac{y}{b}\right) \cdot \left(1 + \frac{y}{b}\right). \quad (14)$$

Рассмотрим систему линейных уравнений

$$\begin{cases} \alpha\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) = \beta\left(1 + \frac{y}{b}\right), \\ \beta\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = \alpha\left(1 - \frac{y}{b}\right), \end{cases} \quad (15)$$

где  $\alpha$  и  $\beta$  — действительные числа, по крайней мере одно из которых отлично от нуля. Каждое из уравнений этой системы задает плоскость. Главные векторы этих плоскостей равны  $\left(\frac{\alpha}{a}, -\frac{\beta}{b}, -\frac{\alpha}{c}\right)$  и  $\left(\frac{\beta}{a}, \frac{\alpha}{b}, \frac{\beta}{c}\right)$  соответственно. Если эти векторы пропорциональны, то  $\frac{\alpha}{\beta} = -\frac{\beta}{\alpha}$ , откуда  $\alpha^2 + \beta^2 = 0$  вопреки выбору чисел  $\alpha$  и  $\beta$ . Это значит, что плоскости пересекаются (см. теорему 13.2).

## Общие уравнения прямолинейных образующих однополостного гиперboloида (2)

Следовательно, геометрический образ системы (15) — прямая. Если  $\alpha, \beta \neq 0$ , то, почленно перемножив уравнения системы (15) и сократив на  $\alpha\beta$ , получим уравнение (14). Если  $\beta = 0$ , а  $\alpha \neq 0$ , то система (15) равносильна совокупности уравнений  $\frac{x}{a} = \frac{z}{c}$ ,  $y = b$ . Очевидно, что если координаты точки удовлетворяют этим двум уравнениям, то они удовлетворяют и уравнениям (14). Легко проверить, что то же верно и в случае, когда  $\beta \neq 0$ , а  $\alpha = 0$ . Таким образом, в любом случае прямая, задаваемая уравнениями (15), лежит на однополостном гиперboloиде, т. е. является его прямолинейной образующей.

Аналогично проверяется, что система уравнений

$$\begin{cases} \alpha(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}) = \beta(1 - \frac{y}{b}), \\ \beta(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}) = \alpha(1 + \frac{y}{b}), \end{cases} \quad (16)$$

где  $\alpha$  и  $\beta$  — действительные числа, по крайней мере одно из которых отлично от нуля, также задает прямолинейную образующую однополостного гиперboloида.

## Общие уравнения прямолинейных образующих однополостного гиперболоида (3)

Системы (15) и (16) задают два бесконечных семейства прямолинейных образующих однополостного гиперболоида. Можно проверить, что семейство прямолинейных образующих, задаваемое системой (15), совпадает с семейством, задаваемым уравнениями (12), а семейство, задаваемое системой (16), — с семейством, задаваемым уравнениями (13). Доказательство этого факта мы опускаем.

# Число прямолинейных образующих гиперболического параболоида, проходящих через данную точку (1)

## 42.3. Прямолинейные образующие гиперболического параболоида

Перейдем к прямолинейным образующим гиперболического параболоида. Их свойства во многом аналогичны свойствам прямолинейных образующих однополостного гиперболоида. Напомним, что гиперболический параболоид задается уравнением вида

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z. \quad (17)$$

### Теорема 42.3

*Через каждую точку гиперболического параболоида проходит ровно две прямолинейных образующих.*

**Доказательство.** Пусть точка  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  принадлежит гиперболическому параболоиду, заданному уравнением (17), а прямая  $\ell$ , проходящая через точку  $M_0$ , является прямолинейной образующей этого параболоида. Пусть параметрические уравнения прямой  $\ell$  имеют вид (2). Положим

$$X = \frac{x}{a}, Y = \frac{y}{b}, Z = z, X_0 = \frac{x_0}{a}, Y_0 = \frac{y_0}{b}, Z_0 = z_0, P = \frac{p}{a}, Q = \frac{q}{b} \text{ и } R = r.$$

## Число прямолинейных образующих гиперболического параболоида, проходящих через данную точку (2)

В этих обозначениях уравнение параболоида принимает вид

$$X^2 - Y^2 = 2Z, \quad (18)$$

а уравнения прямой  $\ell$  — вид (5). Если  $q \neq 0$ , то, разделив вектор  $\vec{a} = (p, q, r)$  на  $Q$ , мы получим направляющий вектор прямой  $\ell$ , вторая координата которого равна  $b$ . Поскольку нам не важно, координаты какого именно из направляющих векторов прямой  $\ell$  стоят в правых частях уравнений (2), в дальнейшем можно считать, что либо  $q = 0$ , либо  $q = b$ , т. е. либо  $Q = 0$ , либо  $Q = 1$ . Подставим правые части уравнений (5) в уравнение (18). Получим

$$(X_0 + Pt)^2 - (Y_0 + Qt)^2 = 2(Z_0 + Rt). \quad (19)$$

С другой стороны,

$$X_0^2 - Y_0^2 = 2Z_0, \quad (20)$$

поскольку точка  $M_0$  лежит на параболоиде. Вычтем равенство (20) из равенства (19). После очевидных преобразований, получим

$$(P^2 - Q^2)t^2 + 2(X_0P - Y_0Q - R)t = 0.$$

Поскольку все точки прямой  $\ell$  лежат на параболоиде, последнее равенство должно выполняться для любого  $t$ .

## Число прямолинейных образующих гиперболического параболоида, проходящих через данную точку (3)

Это возможно лишь в случае, когда

$$\begin{cases} P^2 - Q^2 = 0, \\ X_0 P - Y_0 Q - R = 0. \end{cases}$$

Если  $Q = 0$ , то первое из этих равенств показывает, что  $P = 0$ , но тогда и  $R = 0$  в силу второго равенства. В этом случае  $p = q = r = 0$ . Но это невозможно, поскольку  $\vec{a} \neq \vec{0}$ . В силу сказанного выше, можно считать, что  $Q = 1$ . Следовательно,

$$\begin{cases} P^2 = 1, \\ X_0 P - Y_0 = R. \end{cases} \quad (21)$$

Первое из этих уравнений показывает, что  $P = \pm 1$ . Из второго уравнения системы (21) вытекает теперь, что  $R = \pm X_0 - Y_0$ . Следовательно,  $p = \pm a$ ,  $q = b$  и  $r = \pm \frac{x_0}{a} - \frac{y_0}{b}$ . Таким образом, направляющий вектор прямой  $\ell$  может быть выбран двумя способами:  $\vec{a}_1 = (a, b, \frac{x_0}{a} - \frac{y_0}{b})$  и  $\vec{a}_2 = (-a, b, -\frac{x_0}{a} - \frac{y_0}{b})$ . Следовательно, через точку  $M_0$  проходят ровно две прямолинейных образующих. □

# Параметрические уравнения прямолинейных образующих гиперболического параболоида

Прежде чем формулировать еще одну теорему о свойствах прямолинейных образующих гиперболического параболоида, заметим, что, в силу сказанного выше, уравнения прямолинейных образующих, проходящих через точку  $M_0$ , имеют вид

$$\begin{cases} x = x_0 + at, \\ y = y_0 + bt, \\ z = z_0 + \left(\frac{x_0}{a} - \frac{y_0}{b}\right)t \end{cases} \quad (22)$$

и

$$\begin{cases} x = x_0 - at, \\ y = y_0 + bt, \\ z = z_0 + \left(-\frac{x_0}{a} - \frac{y_0}{b}\right)t. \end{cases} \quad (23)$$

Уравнения вида (22) и (23) задают два бесконечных семейства прямолинейных образующих гиперболического параболоида. Из доказательства теоремы 42.3 вытекает

## Замечание 42.4

*Через каждую точку гиперболического параболоида проходит по одной прямолинейной образующей из каждого семейства.*



# Взаимное расположение прямолинейных образующих гиперболического параболоида (1)

## Теорема 42.4

*Любые две прямолинейные образующие гиперболического параболоида из разных семейств пересекаются. Любые две прямолинейные образующие из одного семейства скрещиваются.*

**Доказательство.** Пусть  $\ell_1$  — прямолинейная образующая из семейства, задаваемого уравнениями вида (22),  $\ell_2$  — прямолинейная образующая из семейства, задаваемого уравнениями вида (23), а  $M_1(x_1, y_1, z_1)$  и  $M_2(x_2, y_2, z_2)$  — точки, лежащие на  $\ell_1$  и  $\ell_2$  соответственно. Прямая  $\ell_1$  имеет направляющий вектор  $\vec{s}_1 = (a, b, \frac{x_1}{a} - \frac{y_1}{b})$ , а прямая  $\ell_2$  — направляющий вектор  $\vec{s}_2 = (-a, b, -\frac{x_2}{a} - \frac{y_2}{b})$ . Векторы  $\vec{s}_1$  и  $\vec{s}_2$  не коллинеарны, так как  $\frac{a}{-a} \neq \frac{b}{b}$ . Поэтому для того, чтобы проверить, что прямые  $\ell_1$  и  $\ell_2$  пересекаются, достаточно убедиться в том, что они лежат в одной плоскости.

## Взаимное расположение прямолинейных образующих гиперболического параболоида (2)

В самом деле, учитывая, что точки с координатами  $(x_1, y_1, z_1)$  и  $(x_2, y_2, z_2)$  лежат на параболоиде, и потому  $\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 2z_1$  и  $\frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} = 2z_2$ , имеем

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ a & b & \frac{x_1}{a} - \frac{y_1}{b} \\ -a & b & -\frac{x_2}{a} - \frac{y_2}{b} \end{vmatrix} = (x_2 - x_1) \left( -\frac{b}{a} \cdot x_2 - y_2 - \frac{b}{a} \cdot x_1 + y_1 \right) - \\ & - (y_2 - y_1) \left( -x_2 - \frac{a}{b} \cdot y_2 + x_1 - \frac{a}{b} \cdot y_1 \right) + (z_2 - z_1) \cdot 2ab = \\ & = \frac{b}{a}(x_1^2 - x_2^2) - (x_1 - x_2)(y_1 - y_2) - \frac{a}{b}(y_1^2 - y_2^2) + (x_1 - x_2)(y_1 - y_2) + \\ & + 2ab(z_2 - z_1) = ab \left( \frac{x_1^2 - x_2^2}{a^2} - \frac{y_1^2 - y_2^2}{b^2} + 2z_2 - 2z_1 \right) = \\ & = ab \left( \frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} - 2z_1 \right) - ab \left( \frac{x_2^2}{a^2} - \frac{y_2^2}{b^2} - 2z_2 \right) = \\ & = ab \cdot 0 - ab \cdot 0 = 0 - 0 = 0. \end{aligned}$$

В силу теоремы 14.3 прямые  $\ell_1$  и  $\ell_2$  лежат в одной плоскости.

## Взаимное расположение прямолинейных образующих гиперболического параболоида (3)

Пусть теперь  $\ell_1$  и  $\ell_2$  — различные прямолинейные образующие из одного семейства. Для определенности будем считать, что эти прямые принадлежат семейству, задаваемому уравнениями вида (22) (для семейства, задаваемого уравнениями вида (23), доказательство аналогично). Полагая в (22)  $t = -\frac{x_0}{a}$ , получаем  $x = 0$ . Таким образом, каждая прямолинейная образующая из нашего семейства проходит через точку с абсциссой 0. Пусть  $M_1(0, y_1, z_1)$  и  $M_2(0, y_2, z_2)$  — точки, лежащие на прямых  $\ell_1$  и  $\ell_2$  соответственно. В качестве направляющих векторов прямых  $\ell_1$  и  $\ell_2$  можно взять векторы  $\vec{s}_1 = (a, b, -\frac{y_1}{b})$  и  $\vec{s}_2 = (a, b, -\frac{y_2}{b})$  соответственно. В силу теоремы 14.3 достаточно показать, что

$$\begin{vmatrix} 0 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ a & b & -\frac{y_1}{b} \\ a & b & -\frac{y_2}{b} \end{vmatrix} \neq 0. \quad (24)$$

## Взаимное расположение прямолинейных образующих гиперболического параболоида (4)

Имеем

$$\begin{vmatrix} 0 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ a & b & -\frac{y_1}{b} \\ a & b & -\frac{y_2}{b} \end{vmatrix} = -(y_2 - y_1) \left( -\frac{ay_2}{b} + \frac{ay_1}{b} \right) + (z_2 - z_1)(ab - ab) = \frac{a(y_1 - y_2)^2}{b}.$$

Если  $y_1 \neq y_2$ , то неравенство (24) выполнено. Предположим теперь, что  $y_1 = y_2$ . Учитывая, что точки  $M_1$  и  $M_2$  лежат на гиперboloиде, получаем, что  $\frac{0}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 2z_1$  и  $\frac{0}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 2z_2$ , откуда  $z_1 = -\frac{y_1^2}{2b^2} = z_2$ . Следовательно, точки  $M_1$  и  $M_2$  совпадают. Кроме того, в этом случае прямые  $\ell_1$  и  $\ell_2$  имеют один и тот же направляющий вектор, а именно, — вектор  $(a, b, -\frac{y_1}{b})$ . Но это значит, что прямые  $\ell_1$  и  $\ell_2$  совпадают вопреки их выбору. □

## Общие уравнения прямолинейных образующих гиперболического параболоида (1)

Как и в случае однополостного гиперboloида, можно указать общие уравнения прямолинейных образующих гиперболического параболоида, для написания которых надо знать только уравнение параболоида и не надо знать координаты точки, принадлежащей ему.

Пусть гиперболический параболоид задан уравнением (17). Легко проверяется, что системы уравнений

$$\begin{cases} \alpha(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}) = 2\beta, \\ \beta(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}) = \alpha z, \end{cases} \quad (25)$$

где  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  и  $\alpha \neq 0$ , и

$$\begin{cases} \alpha(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}) = \beta z, \\ \beta(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}) = 2\alpha, \end{cases} \quad (26)$$

где  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  и  $\beta \neq 0$ , задают прямые, лежащие на нашем параболоиде.

Убедимся в этом на примере системы (25) (для системы (26)

доказательство аналогично). Плоскости, задаваемые первым и вторым из уравнений (25), имеют главные векторы  $\vec{n}_1 = (\frac{\alpha}{b}, -\frac{\alpha}{b}, 0)$  и  $\vec{n}_2 = (\frac{\beta}{a}, \frac{\beta}{b}, -\alpha)$ . Если  $\vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2$ , то, приравнявая отношения первых и третьих координат этих векторов, имеем  $\alpha = 0$  вопреки сказанному выше. Следовательно, векторы  $\vec{n}_1$  и  $\vec{n}_2$  не коллинеарны.

## Общие уравнения прямолинейных образующих гиперболического параболоида (2)

Это означает, что плоскости, задаваемые первым и вторым из уравнений (25), пересекаются, и потому уравнения (25) задают прямую. Если  $\beta \neq 0$ , то, почленно перемножив уравнения системы (25) и сократив на  $\alpha\beta$ , получим уравнение (17). Если же  $\beta = 0$ , то система (25) равносильна совокупности уравнений  $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0$ ,  $z = 0$  (напомним, что  $\alpha \neq 0$ ). Очевидно, что из этих равенств вытекает уравнение (17).

Системы (25) и (26) при указанных ограничениях на  $\alpha$  и  $\beta$  задают два бесконечных семейства прямолинейных образующих гиперболического параболоида. При этом семейство прямолинейных образующих, задаваемое системой (25), совпадает с семейством, задаваемым уравнениями (22), а семейство, задаваемое системой (26), — с семейством, задаваемым уравнениями (23). Доказательство этого факта мы опускаем.